

ferrugineis, femoribus obscurioribus; micans, abstante pilosa, haud pubescens, dense et regulariter longitrorsum striata; mandibulae nitidae, ruguloso-striatae, triangulares angulo postico-interno obtuso, sed distincto, margine masticatorio acuto, antice indistincte crenulato; clypeus margine antico arcuato; pronotum antice striis transversis, extus curvatis et retro directis; metanotum inerme planitie declivi verticali et concava, a planitie basali separata carina arcuata distincta; petioli nodus supra transverse (indistincte concentrice) striatus, absque processu.

G. concentrica Mayr simillima differt magnitudine majore, striis distinctissime subtilioribus et densius approximatis, deinde carina arcuata inter metanoti partem basalem et declivem.

G. concentrica Mayr.

Typheopone Westw.

T. serratula Smith, Cat. B. M. 111.

Odontomachus Lat.

O. haematodes L. Sys. Nat. II, 965.

Tetramorium Mayr.

T. guineense F. E. S. II, 357:

T. simillimum Nyl. Ann. S. Nat. IV, Sec. V, 94.

T. sigmoideum Mayr n. sp.

Operaria: Long. 2^{mm}. Rufo testacea abdomine nonnunquam infuscato; pilosa pilis erectis obtusis, antennarum scapo pedibusque pilis adpressis; opaca abdomine nitido; mandibulae nitidae et subtilissime striolatae; caput dense et subtiliter reticulato-punctatum, fronte et vertice inter laminae frontales ad capitis marginem posticum productas striis longitudinalibus dispersis; antennae 12 articolatae; thorax dense et subtiliter reticulato-punctatus, a latere visus supra subtiliter sigmoideus