

Hephaestion malleri Melzer

Itayopolis, Estado de Santa Catarina, Brasil, 750 m.,
24-12-1928, A. Maller col., TYPUS, 1 ex.

Hephaestion zikáni Melzer

Fazenda dos Campos, 1500 m., Passa Quatro, Est. de
Minas Gerais, Brasil, 29-11-1920, J. F. Zikán col., TYPUS,
2 ♀♀.

Heterachtes mutabilis Melzer

Irazu 2200 m., 5-1933; Vulcão Irazu 2800-3000 m., Costa
Rica, 15-1-1926, F. Nevermann col., COTYPUS, 2 ex.

Ibidion bondari Melzer

Mar de Espanha, Est. de Minas Gerais, Brasil, 27-11-1909,
J. F. Zikán col., TYPUS, 3 ex.

Ibidion imaculipenne Melzer

Salta, Rep. Argentina, 1-1930, Dr. L. Witte col., TYPUS,
1 ex.; Salta; Corral Queimado, Catam., Rep. Argentina,
Dr. L. Witte e Weiser col., COTYPUS, 3 ex.

Ibidion opacicolle Melzer

Itatiaia, Est. do Rio de Janeiro, Brasil, 12-2-1927, J. F.
Zikán col., TYPUS, 1 ex., COTYPUS, 2 ex.

Ibidion v-flavum Melzer

Farm La Caja, São José, Costa Rica, 2-4-1924, F. Never-
mann col., COTYPUS, 1 ex.

Lygrocharis neivai Melzer

Saúde, São Paulo, Est. de São Paulo, Brasil, 2-12-1915,
J. Melzer col., TYPUS, 6 ex.

Lygrocharis nigripennis D. Mendes

Rio Negro, Est. do Paraná, Brasil, 15-11-1925, M. Witte
col., TYPUS, 2 ♀♀, Nova Teutonia, 26-10-1937, 30-11-1937,
Est. de Santa Catarina, Brasil, Fritz Plaumann col.,
HOLOTYPE, 1 ♂, ALLOTYPUS, 1 ♀.