

Família *Scelionidæ*

*Telenomus mormideae* Costa Lima

Cachoeira, Est. do Rio Grande do Sul, Brasil, 15-3-1935  
Carlos R. Reiniger col., COTYPUS, 13 ex.

Família *Formicidæ*

*Acromyrmex rugosus navarroi* Borgmeier

São Paulo, Brasil, 5-1923, Dr. Ed. Navarro de Andrade  
col., COTYPUS, 1 ex., operaria.

*Acromyrmex boliviensis nigriceps* Santschi

Sem procedencia. COTYPUS, 2 ex., operarias.

*Acropyga paramaribensis* Borgmeier

Paramaribo, Guiana Holandeza, 1932, Buenzli col., TYPUS,  
1 ♂, 1 ♀, e 1 operaria, láminas ns. 614, 613, 612; COTYPUS,  
♀ e operarias, com láminas ns. 615, 616, 617, 618, 619  
e 620.

*Apterostigma fallax* Borgmeier

Paramaribo, Guiana Holandeza, 1932, Buenzli col., TYPUS,  
1 operaria, PARATYPUS, 1 ex. em lámina n.º 633.

*Atta sexdens robusta* Borgmeier

Nucleo Colonial de São Bento, Est. do Rio de Janeiro,  
Brasil, 15-10-1935, A. T. M. Torres col., COTYPUS, 8  
operarias, e mais numerosos exemplares em alcool.

*Azteca paraensis bondari* Borgmeier

Estado da Bahia, Brasil, 2-1930, G. Bondar col., COTYPUS,  
(n.º 1842), 3 ex. operarias.

*Basiceros squamifer* Borgmeier

Jussaral, Angra dos Reis, Est. do Rio de Janeiro, Brasil,  
30-10-1935, H. S. Lopes col., COTYPUS, (n.º 5510), 4 ex.  
operaria.