

posterior. Escapo liso con finas punteaduras, sobrepasando perfil posterior cefálico por un diámetro ocular, con pelos decumbentes a semi-erguidos; tercer artejo antenal dos veces más largo que ancho. Ojo compuesto relativamente plano, formando convexidad muy tenue.

Mesosoma en vista lateral con perfil promesonotal convexo, perfil del metanoto – propodeo más o menos recto hasta altura del espiráculo propodeal, perfil posterior interrumpido por denticulos triangulares propodeales. Mesosoma lateralmente con arrugas paralelas, longitudinales a oblicuas, sobre pronoto y pleuras; sutura entre pronoto y mesopleura bien marcada, pronoto sin surco ventral; sutura mesometapleural marcada pero no profunda; sutura mesopleural reducida, se confunde con relieve circundante. Anepisterno relativamente esbelto, sin sutura que lo separe de la metapleura, pero distinguible por diferencias en relieve; catepisterno sin surco anterior ventral. Espiráculo a ras de cutícula circundante, separado por lo menos un diámetro de base del denticulo y del borde declinante; superficie declinante propodeal con arrugas transversales y áreas lisas laterales. Dorso mesosomal con costillaje longitudinal, más irregular posterior al surco metanotal; sutura promesonotal reducida, apenas reconocible como pequeña hendidura mediana.

Nudo peciolar en vista dorsal con arrugas transversales; lateralmente sin repisa anterior, perfil anterior recto y reclinado, perfil dorsal ampliamente convexo, casi tan largo como perfil anterior, sin cresta transversal anterior; proceso ventral con breve lóbulo proyectándose anteriormente, posteriormente redondeado, sin carenas laterales. Tergo del pospeciolo lateralmente con arrugas oblicuas bajas, de aspecto derretido entremezcladas con punteaduras; dorsalmente con arrugas transversales anteriores encorvadas lateralmente hacia atrás; posterior medialmente con algunas breves arrugas longitudinales; esterno principalmente liso con punteaduras, posterolateralmente con arrugas arqueadas; proceso anterior ventral forma una “V” en ángulo obtuso, sin cresta posterior. Segundo tergo gastral con arrugas paralelas longitudinales, cada vez menos profundas lateralmente hasta dejar solamente hileras de punteaduras. Procoxa con arrugas transversales paralelas, lisa anteriormente; base del protarso opuesto al espolón con hilera de setas gruesas, ápice del segundo protarso con seis setas gruesas; metacoxa sin diente. Cuerpo negro; patas y escapo marrón oscuro; funículo y mandíbulas marrón.

**Reina.** Medidas [Paratipo]: LC 1,23; AC 1,08; LM 0,98; LE 1,04; DO 0,31; LW 2,54 mm. IC 0,89; IE 0,91; IM 0,91; IO 0,29. Aparte de las diferencias usuales entre reina y obrera cabe señalar la sutura mesopleural bien definida; la delimitación posterior del anepisterno por una sutura y los denticulos propodeales más pequeños.

**Macho.** Desconocido.

**Comentarios.** El ejemplar Holotipo fue hallado en una muestra de hojarasca y madera descompuesta tamizada tomada en un bosque húmedo. El paratipo también fue hallado en un bosque húmedo. Por su apariencia en general podría confundirse con las especies *G. semiferox* o *G. schmitti*, pero estas últimas especies carecen de dientes sobre el propodeo. El borde masticador mandibular en *G. semiferox* es cóncavo y en *G. schmitti* la cabeza es más ancha que larga en vista frontal.

**Etimología.** El nombre específico se deriva de la voz Latina para isla, *insula*, e *insularis* (“de la isla”) alude al origen insular de esta especie,.

### *Gnamptogenys lavra* sp. n.

(Figura 6)

**Diagnosis.** Mandíbulas triangulares con superficie dorsal lisa y pulida, ojos compuestos con apenas un omatidio; en vista lateral espiráculo propodeal separado del declive por un diámetro; dorso de metacoxa sin diente o lóbulo; en vista lateral nudo peciolar más alto que largo.

**Holotipo.** Brasil, Minas Gerais, Lavras, 30-iii-1975, W.D. Fronk. Embudo de Berlese. Una obrera depositada en el MCZC.

**Obrera.** Medidas: [Holotipo] LC 0,80; AC 0,67; LM 0,38; LE 0,50; DO 0,04; LW 1,01 mm. IC 0,83; IE 0,76; IM 0,57; IO 0,05. Cabeza en vista frontal alargada, más ancha anterior- que posteriormente; margen lateral convexo; margen posterior cóncavo; margen anterior con pequeño lóbulo posterior a inserción mandibular; clipeo antero-medialmente prominente; lámina del clipeo poco desarrollada, margen anterior convexo, formando ángulo obtuso con lados rectos. Escapo no alcanza margen posterior, dorsalmente liso y pulido con punteaduras pilíferas finas; lóbulos frontales convexos, levantados dorso-oblicuamente; lóbulo dorsal del tórulo separado del lóbulo frontal, sobresaliendo más cerca del cóndilo antenal que del borde lateral del lóbulo frontal. Frente cefálico con costillaje paralelo longitudinal, costillas con finas impresiones transversales otorgando aspecto granuloso, costillaje sobre clipeo más fino y sin