

granulosidad; occipucio liso, lado ventral cefálico con costillaje longitudinal. Mandíbula triangular, dorsalmente lisa y pulida con punteaduras finas, margen masticador denticulado; sección transversal cuneiforme. Ojo con un omatidio. Vértice plano, formando ángulo relativamente recto con frente. Palpo maxilar unisegmentado; palpo labial bisegmentado.

Dorso mesosomal y declividad propodeal con costillaje paralelo longitudinal granuloso; cara anterior pronotal con costillaje transversal; sutura promesonotal bien impresa, interrumpiendo costillaje; surco metanotal ausente; declividad propodeal con ángulo lateral-anterior. Lado mesosomal con costillaje longitudinal, sutura mesopleural y anepisterno indistinguibles; sutura mesometapleural impresa; espiráculo propodeal dirigido posterolateralmente, separado de margen declinante por un diámetro. Mesosoma en vista lateral con promesonoto formando convexidad y metanotopropodeo formando otra convexidad, margen declinante propodeal ligeramente cóncavo, separado de margen dorsal por ángulo casi recto.

Peciolo erguido con margen anterior ligeramente cóncavo, nudo sin carena transversal anterior; cara dorsal con costillaje transversal, pasando a oblicuo en cara lateral, costillaje formando arcos concéntricos en cara posterior. Proceso ventral en vista lateral semi-cuadrado, en vista ventral cuneiforme con superficie ventral plana y margen posterior recto, no hendido. Gáster en vista lateral con margen dorsal separado de margen anterior por ángulo fuerte; cara anterior lisa y pulida, dorso pospeciolar finamente rugoso, más esculpido anteriormente que posteriormente que tiende a liso y pulido; lados con fina rugosidad longitudinal a oblicua, cara ventral rugosa; proceso antero-ventral cóncavo. Cuarto tergo abdominal con mayor área lisa y pulida que tergo anterior y con arrugas más finas, esterno con rugosidad fina.

Cuerpo píceo, antenas ferruginosas, patas y mandíbulas marrón con tendencia más clara hacia ápice. Procoxa con costillaje transversal; base del protarso opuesto al espolón con una sola seta gruesa; segundo segmento protarsal con cuatro setas gruesas en ápice antero-ventral; dorso metacoxal sin diente o lóbulo.

Reina, Macho. Desconocidos.

Comentarios. El ejemplar Holotipo está montado en un alfiler con tres triángulos de cartulina, uno tiene una pata delantera, uno el gáster y el tercero sostiene el resto del cuerpo. Esta especie se asemeja mucho a las especies del grupo "striatula" (Lattke, 1995) pero en una perspectiva lateral todas estas especies tienen el espiráculo propodeal situado justo en el margen posterior del propodeo, colindante con la cara

declinante, mientras que en *G. lavra*, éste está separado del margen posterior. Una serie de características la ubican cerca del grupo de especies emparentadas con *G. relicta* (Mann, 1916), como los ojos reducidos, tendencia a nudo peciolar disciforme, proceso ventral peciolar semi-cuadrado con una superficie ventral plana y cuneiforme. Por el otro lado carece de una sutura mesopleural bien definida y el proceso subpeciolar con el margen posterior hendido en vista ventral. A primera vista parece una especie emparentada con el grupo "striatula" que ha retenido más plesiomorfias que las demás especies del grupo. La gran mayoría de las especies de *Gnamptogenys* tienen un lóbulo o denticulo sobre la cara dorsal de la metacoxa. Sin embargo, en varias especies ubicadas en diferentes agrupaciones la metacoxa es inerte, como en el caso de *G. reichenspergi* (Santschi, 1929) del grupo "relicta". Falta un análisis filogenético para determinar si la carencia de armadura metacoxal en *G. lavra* es plesiomórfica o se trata de una pérdida.

Etimología. El epíteto específico "lavra" se deriva del nombre de la localidad tipo, Lavras.

Gnamptogenys rumba sp. n.

(Figura 7)

Diagnosis. Mandíbulas esbeltas, casi falciformes con denticulación irregular, ojos reducidos, propodeo con dos denticulos triangulares; peciolo en vista lateral erguido, en vista dorsal más ancho que largo. Especie endémica en Cuba.

Holotipo. Cuba, Isla de Pinos, S. Casas, v-1975, L. F. Armas *leg.* Dos obreras depositadas en MCZC.

Paratipos. Cuatro obreras del mismo nido del holotipo: (1) Dos obreras en IZAC (2) Una obrera en BMNH (3) Una obrera en MIZA.

Obrera. Medidas: Holotipo (Paratipos, n=5): LC 0,89 (0,88-0,91); AC 0,82 (0,81-0,83); LM 0,56 (0,53-0,57); LE 0,75 (0,70-0,75); DO 0,10 (0,09-0,13); LW 1,17 (1,13-1,20) mm. IC 0,92 (0,91-0,93); IE 0,91 (0,86-0,90); IM 0,68 (0,64-0,70); IO 0,12 (0,10-0,16). Cabeza en vista frontal semi-cuadrada: perfil lateral ampliamente convexo, perfil posterior con leve concavidad mediana, posterior-lateralmente redondeado; frente cefálica principalmente con costillaje fino y punteaduras, con franja mediana longitudinal sin punteaduras hasta parte posterior, costillaje longitudinal medianamente y lateralmente divergente hacia atrás. Vértice esculpido y separado de frente por curvatura continua. Lóbulo frontal convexo, ligeramente alzado dorso-lateralmente, lóbulo dorsal del tórulo separado del lóbulo frontal;