



Figura 5a. Vista lateral de la cabeza, mesosoma y peciolo de *G. insularis*. Figura 5b. Vista dorsal de la cabeza de *G. insularis*. Figura 6a. Vista lateral de la cabeza, mesosoma y peciolo de *G. lavra*. Figura 6b. Vista dorsal de la cabeza de *G. lavra*. Figura 7a. Vista lateral de la cabeza, mesosoma y peciolo de un paratipo de *G. rumba*. Figura 7b. Vista dorsal de la cabeza de *G. rumba*. Barra = 0,5mm.

lámina del clipeo reducida, recta, extremo lateral convexo. Clipeo con costillaje fino y algunas punteaduras. Escapo se ensancha progresivamente hacia el ápice, sobrepasando el borde posterior cefálico por una anchura apical, principalmente liso con algunas punteaduras, sin pubescencia, con algunos pelos decumbentes o semi-erguidos; tercer artejo antenal más largo que ancho. Mandíbula esbelta, casi falciforme, dorso principalmente liso con algunas punteaduras y arrugas longitudinales, especialmente hacia la base; denticulación irregular, con 3-5 dientes grandes además de otros menores. En vista lateral relieve cefálico ventral al ojo más irregular que dorsalmente; ojo reducido, generalmente con menos de 20 omatidios; lóbulo occipital ausente.

Mesosoma en vista lateral semi-rectangular, perfil dorsal principalmente plano con ligera hendidura por surco metanotal. Pronoto con finas arrugas paralelas y oblicuas, margen ventral sin surco; sutura entre pronoto y mesopleura, suturas mesopleural y mesometapleural amplias, profundas con ondulaciones y crestas transversales. Mesopleura con finas arrugas

paralelas; metapleura con costillaje longitudinal ventralmente y oblicuo hacia dorso; propodeo con arrugas longitudinales. Espiráculo propodeal redondo, a ras de cutícula circundante, separado tanto del borde declinante como de la base del denticulo por más de un diámetro. Dorso mesosomal con costillaje fino longitudinal y algunas punteaduras; cuello pronotal con finas arrugas transversales; surco metanotal bien definido; propodeo con tendencia a liso. Superficie propodeal declinante con arrugas más o menos transversales medianeras entre arrugas longitudinales laterales que se arquean y unen posteriormente. Denticulo propodeal en forma de lóbulo triangular bajo con base orientada longitudinalmente, apuntando lateral posteriormente; superficie propodeal entre denticulos cóncava.

Peciolo en vista lateral erguido, perfil anterior más largo que el posterior y dorsalmente convexo, lateralmente arrugado, sin cresta transversal anterior; proceso ventral semi-cuadrado con bordes posteriores marginados; nudo en vista dorsal más ancho que largo; proceso ventral semi-cuadrado en vista lateral formando ángulo recto posterior. Dorso pospeculiar con fino costillaje longitudinal, algo borroso y con algunas punteaduras, esterno con algunas arrugas, ondulaciones y punteaduras, proceso en forma de "V" con breve cresta longitudinal posterior. Dorso del segundo segmento gastral principalmente liso, con algunas estriaciones posteriores. Procoxa lateralmente con costillaje transversal; base de protarso opuesto al espolón con una seta gruesa, dorsalmente punteado con breves ondulaciones longitudinales; ápice del lado ventral del segundo segmento protarsal con cuatro setas gruesas; metacoxa con ángulo dorsal bajo, sin lóbulo o diente. Cuerpo marrón; antenas, mandíbulas, y patas ferruginosas.

Reina, macho. Desconocidos.

Comentarios. La Isla de Pinos también se conoce como la Isla de la Juventud y está localizada al suroeste de la isla principal. La mayor altitud en la isla es solamente 309m. El rótulo indica que las muestras fueron halladas debajo de una piedra. Uno de los ejemplares presenta un ocelo mediano y los ojos compuestos bien desarrollados respecto a los demás especímenes (IO: 0,16 vs. 0,10-0,12). Sin embargo, en los demás aspectos no se diferencia apreciablemente. Este ejemplar se halla en el mismo alfiler que el Holotipo y podría tratarse de una reina ergatoide. A primera vista los ejemplares se parecen a algunas especies de *Gnamptogenys* relativamente pequeñas, de mandíbulas alargadas y semi-trianguulares con cuerpo alargado, como *G. regularis* Mayr 1870 ó *G. continua*. Sin embargo, en corte