

## Liste der Arten

Aus Österreich liegen derzeit gesicherte Nachweise von 122 frei lebenden und acht nicht frei lebenden Arten (mit \* gekennzeichnet) vor. Bei Sammlungsbelegen von zwei weiteren Arten ist aus biogeographischen Gründen anzunehmen, dass sie irrtümlich österreichische Fundortiketten tragen (mit " " gekennzeichnet). Mit den hochgestellten Ziffern korrespondierende Anmerkungen finden sich am Ende der Liste. Uns ist bewusst, dass über den taxonomischen und nomenklatorischen Status einiger Taxa Unklarheit herrscht. Bei Abweichungen sind die von SEIFERT (1996) verwendeten Artbezeichnungen daher zusätzlich in [ ] angeführt.

- Anergates atratulus* (SCHENCK, 1852)  
 "Aphaenogaster sp." <sup>1</sup>  
*Aphaenogaster subterranea* (LATREILLE, 1798)  
*Bothriomyrmex* sp.<sup>2</sup>  
*Camponotus aethiops* (LATREILLE, 1798)  
*Camponotus atricolor* (NYLANDER, 1849)  
 "Camponotus dalmaticus (NYLANDER, 1849)" <sup>3</sup>  
*Camponotus fallax* (NYLANDER, 1856)  
*Camponotus herculeanus* (LINNAEUS, 1758)  
*Camponotus ligniperda* (LATREILLE, 1802)  
*Camponotus piceus* (LEACH, 1825)  
*Camponotus truncatus* (SPINOLA, 1808)  
*Camponotus vagus* (SCOPOLI, 1763)  
*Crematogaster scutellaris* (OLIVIER, 1792)  
*Dolichoderus quadripunctatus* (LINNAEUS, 1771)  
*Doronomyrmex kutteri* (BUSCHINGER, 1965)  
*Doronomyrmex pacis* KUTTER, 1950  
*Epimyrma ravouxi* (ANDRÉ, 1896)  
*Epimyrma stumperi* KUTTER, 1950  
*Formica aquilonia* YARROW, 1955  
*Formica bruni* KUTTER, 1967  
*Formica cinerea* MAYR, 1853  
*Formica cunicularia* LATREILLE, 1798  
*Formica exsecta* NYLANDER, 1846  
*Formica foreli* BONDROIT, 1918  
*Formica fusca* LINNAEUS, 1758  
*Formica fuscocinerea* FÖREL, 1874  
 [F. lefrancoisi BONDROIT, 1918]  
*Formica gagates* LATREILLE, 1798  
*Formica lemani* BONDROIT, 1917  
*Formica lugubris* ZETTERSTEDT, 1838  
*Formica lusatica* SEIFERT, 1997  
 [F. glauca RUSZKY, 1896]  
*Formica paralugubris* SEIFERT, 1996  
*Formica polycтена* FÖRSTER, 1850  
*Formica pratensis* RETZIUS, 1783  
*Formica pressilabris* NYLANDER, 1846  
*Formica rufa* LINNAEUS, 1761  
*Formica rufibarbis* FABRICIUS, 1793  
*Formica sanguinea* LATREILLE, 1798  
*Formica selysi* BONDROIT, 1918  
*Formica suecica* ADLERZ, 1902  
*Formica transcaucasica* NASSONOV, 1889  
*Formica truncorum* FABRICIUS, 1804  
*Formicoxenus nitidulus* (NYLANDER, 1846)  
*Harpagoxenus sublaevis* (NYLANDER, 1849)  
*Hypoponera punctatissima* (ROGER, 1859)  
*Lasius* sp. <sup>4</sup>  
*Lasius alienus* (FÖRSTER, 1850)  
*Lasius balcanicus* SEIFERT, 1988  
*Lasius bicornis* (FÖRSTER 1850)  
*Lasius brunneus* (LATREILLE, 1798)  
*Lasius citrinus* EMERY, 1922  
*Lasius distinguendus* (EMERY, 1916)  
*Lasius emarginatus* (OLIVIER, 1792)  
*Lasius flavus* (FABRICIUS, 1782)  
*Lasius fuliginosus* (LATREILLE, 1798)  
*Lasius jensi* SEIFERT, 1982  
*Lasius meridionalis* (BONDROIT, 1920)  
*Lasius mixtus* (NYLANDER, 1846)  
*Lasius myops* FOREL, 1894  
*Lasius niger* (LINNAEUS, 1758)  
*Lasius nitidigaster* SEIFERT, 1996  
*Lasius paraliensis* SEIFERT, 1992  
*Lasius platythorax* SEIFERT, 1991  
*Lasius psammophilus* SEIFERT, 1992  
*Lasius reginae* FABER, 1967  
*Lasius sabularum* (BONDROIT, 1918)  
*Lasius umbratus* (NYLANDER, 1846)  
*Leptothorax acervorum* (FABRICIUS, 1793)  
*Leptothorax affinis* MAYR, 1855  
*Leptothorax albipennis* (CURTIS, 1854)  
 [L. tuberointerruptus BONDROIT, 1918]  
*Leptothorax clypeatus* (MAYR, 1853)