



Рис. 1. *Leptothorax brauneri* (самец): а — грудь и стебелек в профиль; б — голова спереди.  
Fig. 1. *Leptothorax brauneri* male: а — thorax and peduncle, lateral view; б — head, frontal view.

рой, в пнях, сухих ветвях на деревьях. Один из наиболее обычных видов рода в умеренно увлажненных лесах Европы.

#### *Leptothorax parvulus* (Schenck, 1852)

Schenck, 1852: 103, w (*Myrmica*); Mayr, 1855: 176, w ♀ (*Leptothorax*); Forel, 1874: 86 (*nylanderi* var.); Рузский, 1902: 23; 1905: 598 (*tuberum nylanderi* var.); Арнольди, Длусский, 1978: 541 (*Leptothorax*); Длусский, Союнов, Забелин, 1990: 191. *nylanderi* Foerst.: Длусский, Забелин, 1985: 224—225, nec. Foerster, 1850 et auct.

Распространение: Средняя и Южная Европа, Северная Африка, Молдавия, Крым, Закавказье, Копетдаг.

Близок к *L. nylanderi*, предпочитает более освещенные и сухие леса. Гнезда в древесных остатках, сухих ветвях на деревьях.

#### *Leptothorax brauneri* Ruzsky, 1905

Ruzsky, 1905: 603, w (*servicus* var.), Северный Кавказ, типы не сохранились, неотип (см. ниже) в 3М; Emetu, 1921: 255; Арнольди, 1977: 203—204 (*Leptothorax*); Арнольди, Длусский, 1978: 540.

Распространение: Кавказ, Закавказье. В ранг вида эта форма возведена К.В.Арнольди (1977). В связи с потерей типового материала здесь обозначается неотип: рабочий, "Kutais, Gelaty, №. 4784, 23.IX.1930, K. Arnoldi" — 3М.

Обитает в горных лесах и на лугах. Ниже приводится описание неизвестных ранее самцов. Самки неизвестны.

Материал. 2 ♂, Грузия, Чаквистви, N46, 1.X.1966 (Жижилашвили).

Самец (рис. 1, а, б). Голова слегка удлиненная (ИГ 1,1), затылочные углы широко закруглены, затылочный край прямой, передний край наличника слабовыпуклый. Скапус короткий (ИС 2,75), прямой, членники жгутика усика удлиненные. Мандибулы с явственным жевательным краем и 3 крупными зубцами. Большая часть головы с грубой шагреневой скульптурой, несколько стянутой в области глазков; узкая полоса вдоль лба, лобная площадка и наличник гладкие, на наличнике имеются довольно грубые продольные килевидные морщинки, в верхней части лба нерезкие веерообразно расходящиеся морщинки. Мандибулы гладкие. Проподеум с тупыми