

буграми, без зубцов. Петиолюс с короткой цилиндрической частью, массивный, его узелок сверху закруглен; постпетиолюс по высоте почти равен петиолюсу. Бока проподеума с шагреневой скользящей, на проплеврах нежные поверхностные продольные морщинки, остальная часть груди, в том числе скутум и скутеллом, гладкие и блестящие. Петиолюс с боков с шагреневой скользящей, вершина узелка гладкая, блестящая; постпетиолюс большей частью гладкий, шагрень развита лишь в его нижней части. Отстоящие волоски на теле длинные, тонкие, изогнутые, немногочисленные. Скапус с короткими толстыми полуотстоящими волосками, голени с редким, довольно грубым прилежащим опушением. Цвет красновато-бурый, ноги и усики охристо-желтые.

Размеры: ДГ 0,46, ШГ 0,42, ДС 0,17, ДМ 0,92—0,97 мм.

### *Leptothorax steinbergi* Arnoldi, 1971

Arnoldi, 1971: 1823—1824, w (*Leptothorax*), Центральный Казахстан, голотип в ЗИНе паратипы в ЗМ.

Вид известен по типовой серии. Экология не изучена.

### Группа *korbi*

Грудь низкая, длинная, грубо морщинистая; петиолюс низкий, с очень массивным узелком; проподеум с короткими зубцами или лишь с тупыми бугорками.

Виды этой группы распространены в Закавказье, Иране и Копетдаге. Всего в ней было описано 6 видов, причем 5 из них — в последние два десятилетия.

### *Leptothorax korbi* Emery, 1898

Emery, 1898: 10, w ♀ (*tuberum corticalis* var.), Ленкорань; Рузский, 1905: 589; Emery, 1921: 254 (*corticalis* var.); Арнольди, 1977: 204 (*Leptothorax*).

Распространение: Закавказье. В ранг вида эта форма возведена К.В.Арнольди (1977). Близок к *L. caucasicus*, отличается одноцветно желтой окраской.

Экология не изучена.

### *Leptothorax caucasicus* Arnoldi, 1977

Arnoldi, 1977: 198—199, w (*Leptothorax*), Грузия, Коджори; Армения, Джвеж, поп. материал из Цагвери, голотип и паратипы в ЗМ.

*hasardaghi* Dlussky et Zabelin, 1985: 226—227, w (*Leptothorax*), Копетдаг, Кара-Кала, Ел-Дере, голотип и паратипы ЗМ; Длусский, Союнов, Забелин, 1990: 190, syn. n.

Распространение: Закавказье, Копетдаг.

При изучении типовой серии *L. caucasicus* было обнаружено, что экземпляр из Цагвери, обозначенный К.В.Арнольди в качестве паратипа, является другим видом — он описан как *L.tamarae* (Радченко, 1993), и я затрудняюсь отнести его к какой-либо группе видов (см. Сообщение 4). При описании *L.hasardaghi* (Длусский, Забелин, 1985) среди основных отличительных признаков этого вида от *L. caucasicus* указывалось наличие маленьких острых зубцов на проподеуме, более темная окраска груди и несколько иная форма петиолюса рабочих. Типы обоих видов действительно отлича-