



Рис. 3. *Leptothorax anodontoides* (а, б), *L. volgensis* (в, е), *L. jajlensis* (д, з); а, б — самец, в — е — самки; а, в, д — грудь и стебелек в профиль, б, з, е — голова спереди.

Fig. 3. *Leptothorax anodontoides* (а, б), *L. volgensis* (в, е), *L. jajlensis* (д, з); а, б — male, в — е — female; а, в, д — thorax and peduncle, lateral view, б, з, е — head, frontal view.

Самец (рис. 3, а, б). Голова слегка удлиненная (ИГ 16,6—1,10), широко закругленная за глазами, затылочный край прямой, передний край наличника очень слабовыпуклый. Скапус очень короткий (ИС 3,18—3,40), 2—8-й членики жгутика усика слабоудлиненные, их длина менее, чем в 2 раза превышает ширину. Голова, в том числе лобная площадка и наличник, с продольными морщинками и густой шагреневой скульптурой. Мандибулы с нежными поверхностными штриховатыми морщинками. Скутум с продольными морщинками и негрубой шагренью, скутеллюм лишь с поверхностной шагреневой скульптурой. Проплевры с продольными морщинками и нежной шагренью; скульптура мезоплевр сглажена, бока проподеума в нижней части с морщинками, остальные его части с мелкозернистой скульптурой. Грудь сравнительно длинная (ИМ 1,72—1,73), проподеум с тупыми бугорками, без зубцов. Петиолюс высокий, с прямой передней поверхностью и закругленной вершиной узелка. Постпетиолюс шаровидный, с несколько уплощенной вершиной. Узелок петиолюса с морщинками и негрубой шагренью, постпетиолюс большей частью гладкий и блестящий. Отстоящие волоски на теле немногочисленные, длинные, тонкие, скапус и ноги с редким прилежащим опушением. Цвет черно-бурый, ноги и усики охристо-желтые.