

Размеры: ДГ 0,48—0,49, ШГ 0,43—0,46, ДС 0,14—0,15, ДМ 1,09—1,3 мм.

*Leptothorax iranicus* Radtschenko, 1993

Radchenko, 1993: 26—27, w, (*Leptothorax*), Иран, Тегеран, голотип и параптил в ЗМ.

Известен по типовой серии. Сглаженной скульптурой головы сходен с видами группы *bulgaricus*, по остальным признакам относится к группе *korbi*. Экология не изучена.

Группа *nassonovi*

Грудь желтая различных оттенков, голова часто затемнена, брюшко бурое. Грудь без мезопроподеального вдавления. Шипы проподеума мощные, искривленные вниз, их длина равна или чуть меньше горизонтальной поверхности проподеума.

*Leptothorax nassonovi* Ruzsky, 1895

Ruzsky, 1895: 26—27, w (*Leptothorax*), окр. Симбирска; Оренбургская губ., синтипы в ЗМ; 1896: 72; 1902: 234; 1903: 313; 1905: 579—582; 1916: 8; 1925: 45; 1936: 95; 1946: 70; Караваев, 1915: 499; 1934: 140—142; Emery, 1921: 225; Арнольди, 1971: 1825; Тарбинский, 1976: 94—96; Collingwood, 1976: 303; 1981: 27; Арнольди, Длусский, 1978: 543; Купянская, 1990: 143—144, w ♀ ♂.

*subnudus* Ruzsky, 1905: 581, w (*nassonovi* var.), Манчжурия, типы не сохранились — суп. н.? *firssovi* Kuznetzov-Ugamskij, 1928: 28—29, w (*nassonovi* subsp.), Приморье, ст. Океанская, лектотип и парапектотип (обозначаются здесь) в ЗМ; 1929: 30; Pisarski, 1969a: 225; 1969b: 302; Купянская, 1990 (синонимия).

Степной вид, распространенный от Восточной Украины до Приморья, в горах Средней Азии и в Монголии; в Закавказье отсутствует.

2 экземпляра рабочих с этикеткой "Океанская, VI.26, Кузнецов-Угамский" (ЗМ) обозначаются здесь в качестве лектотипа и парапектотипа *L. nassonovi* subsp. *firssovi*. Эти экземпляры в точности соответствуют первоначальному описанию ssp. *firssovi*, и несомненно идентичны *L. nassonovi* Ruzs. Подобные особи встречаются по всему ареалу, в особенности в Северном Казахстане и Южной Сибири. Типы var. *subnudus* Ruzs. не сохранились; отмеченные М.Д.Рузским (1905) характерные отличия этой формы довольно существенны — почти полное отсутствие отстоящих волосков на груди и стебельке. Подобные экземпляры автору неизвестны, в связи с чем установление синонимии с *L. nassonovi* провизорно.

Гемиксерофил. Обитает в степях различного типа, в том числе горных, на оstepненных лугах. Гнезда в земле. Лет крылатых в июле—августе.

*Leptothorax volgensis* Ruzsky, 1905

Ruzsky, 1905: 582, w (*nassonovi* subsp.), Жигули, типы утеряны, неотип (обозначается здесь) в КК; Emery, 1921: 255; Арнольди, 1977: 540 (*Leptothorax*); Арнольди, Длусский, 1978: 540.

*Stipaceus* Ruzsky: Арнольди, 1971: 1825, nec Ruzsky, 1905 et auct.; Арнольди, 1977 (синонимия).

Распространение: степи от Причерноморья до Западного Казахстана. Гнезда в земле.

Здесь обозначается неотип: рабочий, Украина: Херсонская обл., Аскания-Нова, 14.VI.1985 (Радченко) — КК.

Ниже приводится описание неизвестных ранее самок. Самцы неизвестны.