

et l'écaille (fig. 5). Avant-corps rouge vermillon en montagne, devenant très sombre en plaine chez les ouvrières de toutes tailles. Lco: 4,5-11,6 mm
 *pilisquamis*

Groupe bicolor

Cinq espèces au Maroc

- 1.- Poils de l'occiput noirs; les tibias III portent une pubescence de poils épais, sombres et des épines noires sur le bord interne. Pattes assez longues (LtIII/lat = 1,60-1,75 chez des ouvrières dont lat va de 2,20 à 2,80 mm). Tête, tronc et nœud pourpres, pattes noires. Pétiole arrondi (fig. 6). Lco: 6,0-14,1 mm *bicolor*
 - Poils de l'occiput jaunâtres; les tibias III portent une pubescence fine et claire ainsi que des épines dorées 2
- 2.- Corps noir à aspect moiré, parfois la tête un peu rougeâtre. Pattes longues (LtIII/lat = 1,95-2,15 pour lat de 2,10 à 2,45 mm). Plus petite (Lco: 4,8-10,2 mm). Premier article du funicule antennaire 1,35 à 1,50 fois plus long que le suivant. Propodeum très arrondi (fig. 8) *diehli*
 - Avant corps rouge plus ou moins sombre, gastre noir; parfois le corps entier est presque noir mais ces espèces sont plus grandes, dépassant 11 mm. Premier article du funicule 1,52 à 1,80 fois plus long que le deuxième 3
- 3.- Avant-corps et pattes rouge clair à rouge vermillon, rarement plus sombre; pattes relativement courtes (LtIII/lat = 1,60-1,72; lat de 2,30 à 2,45 mm). Pétiole arrondi (fig. 20). Lco: 4,3-11,8 mm *viatica*
 - Avant-corps pourpre plus ou moins assombri, pattes noires (mais ici, la pubescence est blanche et fine), assez longues (LtIII/lat = 1,75-1,87; lat de 2,58 à 2,75 mm). Pétiole bien arrondi (fig. 7). Lco: 4,8-13,1 mm *savignyi*
 - Une espèce présumée inquiline chez *C. bicolor*; mâles et reines petits.
 *C. hanna* (fig. 2).

Groupe albicans

Sept espèces actuellement connues au Maroc. La forme des pétiotes et les genitalia des mâles permettent de distinguer 2 sous-groupes.

- 1.- Nœud du pétiote «cubique» avec un sommet arrondi et les faces antérieure et postérieure à peu près égales (fig. 9). Ouvrières pouvant dépasser 8 mm de long. Mâles: jusqu'à 12 mm. Le processus supérieur de la sagitta est externe, large et busqué, l'inférieur (beccus) court et vertical (fig. 53); volsella de la valve moyenne brusquement courbée à angle droit (fig. 38); squamula (valve externe) anguleuse et non recouvrante (fig. 36). Sous-groupe *cubica* 2
 - Nœud triangulaire, l'angle apical plus marqué, la face antérieure plus courte que la postérieure (fig. 11). Ouvrières dépassant rarement 7,5 mm. Mâles: rarement plus de 9 mm; sagitta avec 2 longs process, minces et arqués («en lames de sécateur») et situés dans le même plan (fig. 55); courbure de la volsella plus