

- mit grossen gelben oder röthlichen Genitalien; Körper schwarz. 3 — 8.
3. a. Fühlerschaft ganz oder zum Theil gelb oder röthlichgelb; Flügel schwach grünlich getrübt; Beine gelb mit Ausnahme der Basis der Hüften. 4 L. fusca Latr.
- b. Fühlerschaft schwarz oder schwarzbraun. 4.
4. a. Augen kahl. 5.
- b. Augen behaart; Oberkiefer 1—2zählig. 6.
5. a. Flügel bis zur Mitte schwärzlichbraun getrübt, dann plötzlich hell; Oberkiefer 4—5zählig; Stirnfeld glänzend. 3 — 4½ L. sanguinea Latr. (dominula Nyl.)
- b. Flügel blass grünlich oder wasserhell; Oberkiefer 2zählig; Stirnfeld glanzlos. 4 — 4½ L. cunicularia Latr.
6. a. Flügel wasserhell; Hinterkopf ausgerandet. 3 L. exserta Nyl.
- b. Flügel an der Basis schwach getrübt; Hinterkopf nicht ausgerandet; Augen stark behaart. 4½ L. congerens. Först.
- c. Flügel dunkel getrübt, am Ende heller. 4 — 4½ L.
7. a. Oberkiefer ganz schwarz; Augen wenig merklich behaart. 8.
- b. Oberkiefer an dem Ende röthlich; Augen sehr deutlich und dicht behaart. truncicola. Nyl.
8. piniphila, rufa und polycetena. Die M. dieser 3 Arten sind kaum von einander zu unterscheiden; piniphila unterscheidet sich durch etwas stärkeren Glanz des Schildchens. Ohne die W. und A. ist jedoch die Bestimmung unsicher. Man muss hier, um allen Zweifel zu beseitigen, die 3 Geschlechter aus demselben Neste vor sich haben.
9. a. Kopf, Thorax und Hinterleib schwarz oder schwarzbraun. 10.
- b. Thorax schmutziggelb mit 3 braunen Streifen, Schildchen bräunlich; Kopf und Hinterleib braun; Flügel ganz wasserhell mit eben solchen Adern; sehr klein gegen das W. 2 L. pallescens n. sp.
10. a. Hinterleib weitläufig punctirt; Hinterleib weit ausgerandet; M. von gleicher Farbe mit W. und A., schwarz, Hinterleib und Metathorax stark glänzend; Flügel schwach bis zur Mitte getrübt. 2 L. fuliginosa Latr.