

7. *T. caespitum* var. *ferox* Ruzsky.
 Tato forma (sp.? var.?) je velmi dobře charakterisována na pedicelu samičky. Nalezl jsem 1 samičku zakládající kolonii pod kamenem na Lápadu u Grže (VII. 23). (Exemplář v koll. prof. Emeryho).
 Podčeled: *Dolichoderinae*:
Dolichoderus, Lund 1831.
 Rod teplých pásů zasahující do střední Evropy. Jediný druh:
8. *D. quadripunctatus* Lund.
 Nalezl jsem 1 dělnici (VII. 22) a 1 samičku (VII. 23) na stromě v háji Savinském v Boce Kotorské. Očekával jsem, že bude *D. q.* hojnější v Dalmacii, ježto u nás (na Moravě a v Čechách) vyskytá se jen na teplých lokalitách.
 Podčeled: *Formicinae*.
Lasius, (Fabr. 1804).
 Ve střední a severní Evropě nejobecnější typ. V Dalmacii nehojný až vzácný. Kromě sběru Müllerových jsem nalezl:
9. *L. niger lasiodes* Emery.
 Kolonie s okřídlenou samičkou na Savině u Erceg Novi (VII. 23).
Formica, (Linné 1758).
 Velmi hojný ve střední a severní Evropě. Typický mravenec naší fauny. V Dalmacii vzácný, jen v horách poněkud hojnější.
10. *F. gagates* Latr.
 mnoho dělnic, samečků a samiček v háji na Savině v Boce Kotorské (VII. 23). Tento mravenec vyskytá se na teplých lokalitách i ve střední Evropě (na př. v jižní Moravě), očekával jsem tedy, že v Dalmacii bude hojnější.
11. *F. fusca fusca* L.
 několik dělnic na svahu Radostaku v Boce Kotorské (VII. 23). V našich krajích jeden z nejhojnějších mravenců, na jihu velmi vzácný.
12. *F. fusca fusca* var. *rubescens* For.
 několik dělnic v kamenech na svahu Radostaku v Boce Kotorské (VII. 23).
Cataglyphis, Först. 1850.
 Rozšířený v nemnophytrých druzích hlavně v teplých oblastech.
13. *C. bicolor* var. *nodus* Brullé.
 několik dělnic na cestě u Metkoviče a u Mostaru (VII. 13). Jinde jsem těchto mravenců od té doby nenalezl.
Camponotus, Mayr 1861.
 Bohatý rod rozšířený po celém světě.
14. *C. fallax* Nyl.
 Po 1 dělnici ve Srebrnu u Dubrovníka a u Igala (Erceg Novi) v Boce Kotorské, na vrbě. Druh tento zaměňován byl pod jménem *C. marginata* s *C. aethiops* var. *marginata*, proto jsou starší identifikace nespolehlivé. Druh celkem vzácný, zasahující do střední Evropy, kde se nejvíce vyskytá na včelínech.
Colobopsis, Mayr 1861.
 Rod rozšířený po jižní a východní Evropě. Všude vzácný.
15. *C. truncatus* Spin.
 1 dělnici na stromě v háji na Savině v Boce Kotorské (VII. 22).

Nové lokality dalmatských mravenců:

- Aphaenogaster obsidianus* var. *epirotes* Latr.: Trsteno u Dubrovníka, ve velmi vlhké zemi u potůčku.
Aphaenogaster subterranea Latr. v háji na Savině tvoří asi 10% veškeré fauny mravenců.
Aphaenogaster splendida Rog., vzácný mravenec, 1 ex. na koupališti Bačeviće u Splitu.
Messor barbarus structor var. *tyrrhena* Em. hojný v Boce Kotorské.
Messor barbarus barbarus var. *nigra* André na Marijanu u Splitu.