

schäfte den Hinterrand des Kopfes um ungefähr $\frac{1}{5}$ ihrer Länge überragend; Geisselglieder ungefähr $1\frac{1}{2}$ mal so lang als breit, mit Ausnahme des ersten und letzten, die mehr als zweimal so lang wie breit sind (*b*).

Thorax kaum breiter als der Kopf, in Seitenansicht oben ganz flach konvex, nach vorn unter einem rechten, stark abgerundeten Winkel, hinten im Epinotum schräg und leicht konvex abfallend.

Schuppe trapezförmig, etwas breiter als lang, ihr Ober- rand stumpfwinklig eingekerbt, zu beiden Seiten abgerundet.

Hellbraun, die Umgebung der Ocellen, die obere Fläche des Mesonotums bei manchen Stücken, der Gaster bei den meisten angedunkelt. Mandibeln dunkelbraun, die Zähne fast schwarz.

Kopf lederartig gerunzelt, Clypeus, Stirnleisten und Umgebung der Ocellen kräftiger, zwischen den Stirnleisten parallel, in der Ocellargegend nach hinten divergierend, die Occipital- gegend feiner (bei Fig. *a*). Pronotum, vorderster Teil des Mesonotums und die Seiten der übrigen Thoraxteile in derselben Weise längsgerunzelt wie die Occipitalgegend, die Skulptur auf den Rücken hin mikroskopisch fein werdend; noch feiner die Längsskulptur des Gaster.

Körper mit ziemlich langer, blassgelber, seidenglänzender Pubescenz, der Anordnung der Runzeln folgend, reichlich auf dem Kopf, die Mandibeln ausgenommen, auf Fühlern und Beinen, noch reichlicher auf dem Gaster. — Auf den Mandibeln schräg abstehende, längere, auf den Fühlern in grösserer Menge kürzere Borsten. Sparsame, senkrecht abstehende Borsten auf Kopf, Thorax und Gaster, auf dem Ende des letzteren zahlreicher. Beborstung der Beine sparsam, kurz, schräg abstehend. Alle Borsten blassgelb.

♂. (Fig. 4). Kopffläche zwischen Innenrand der Augen und Vorderrand des Clypeus breit rechteckig, dahinter viel breiter und jederseits flach bogenförmig gekrümmt. Der die Ocellen tragende, stark hervortretende Occipitalhöcker nimmt etwas mehr als das mittlere Drittel des Kopfhinterrandes ein. Augen sehr gross, halbkuglig, ihr Längsdurchmesser ungefähr so gross als der Abstand ihres Hinterrandes von dem des Kopfes, ihr Vorderrand sehr nahe den Mandibularecken, ihr Innenrand von vorn gesehen fast gerade. Mandibeln verhältnismässig breit, ihr Innenrand mit abgerundeter Ecke, am Ende mit spitzem Apicalzahn, davor einem kleineren, breiteren Zahn (*c*). Clypeus in der Mitte stark konvex, mit geradem Vorderrand. Stirnleisten kurz, so breit wie die Hälfte der Entfernung zwischen den Innenrändern der Augen, mit parallelen, leicht konkaven Rändern, die in Höhe des hinteren Augenrandes enden. Stirnfeld undeutlich. Stirnrinne glänzend. Fühler-