

21. *Lasius niger* L. r. *aliena* FOERST.

FOERSTER, Hymenopteren-Stud. 1, 1850, S. 36 (71).

2 ♂. S. Mongolei, HUMMEL; 2 ♀. China (Shansi), SJÖLANDER.

22. *Formica (Coptoformica) exsecta* NYL. v. *fuscali* WHEEL.

WHEELER, Psyche 21, 1914, S. 26.

1 ♂, 5 mm, China, SJÖLANDER.

23. *Formica (Serviformica) picea* NYL.

NYLANDER, Act. Soc. Sc. Fenn. 2, 1846, S. 917.

6 ♂, 4—4,3 mm, S. Mongolei, China (S. Kansu) HUMMEL;
5 ♀, 6 mm, China (S. Kansu). HUMMEL.24. *Formica (Serviformica) fusca* L. r. *japonica* MOTSCH.

MOTSCHULSKY. Bull. Soc. Nat. Moscou 39, 1866, S. 183.

Zahlreiche ♂, 5—4 mm, China (NO. Szechuan, S. Kansu),
HUMMEL.25. *Formica (Serviformica) rufibarbis* F. v. *clara* FOR.

FOREL, Ann. Sec. ent. Belg. 30, 1886, S. 206.

WHEELER, Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard 13, 1913, S. 516.

4 ♂, S. Mongolei, HUMMEL; 1 ♀, SW. Mongolei, SÖDERBOM.

26. *Formica rufa* L. r. *truncorum* F. v. *yessensis* FOR.(?)

FOREL, Mitt. naturhist. Mus. Hamburg 18, 1901, S. 66 (♂).

EMERY, D. ent. Z. 1909, S. 188.

3 ♀. China (Shansi), SJÖLANDER.

Thorax schmäler als bei der Stf. Kopfvorderfläche und
Fühlerschäfte sparsam absteht behaart. Kopf rot, bei einem
Stück auf dem Clypeus ein schwarzer Längsfleck.

Tryckt den 26 januari 1934.