

Petiolusknoten in Seitenansicht vorn länger und schräger, hinten kürzer und etwas steiler abfallend, die Kuppe gleichmäßig flach konvex, die Stielchenverlängerung nicht abgesetzt. Petiolus von oben gesehen mit der Stielchenverlängerung ein wenig länger als das Epinotum, der Knoten länglich birnförmig, abgerundet gekantet, vorn in das schmale, ungefähr ebenso lange Stielchen übergehend. Postpetiolus, etwas kürzer als der Petiolus, in Seitenansicht ebenso hoch und oben ähnlich konvex wie dieser, von oben gesehen doppelt so breit, seine Seiten leicht konvex, nach hinten divergierend.

Kopf und Gaster schwarz, die Beine bräunlich schwarz, nach dem Ende hin braun werdend. Thorax, Petiolus und Gaster um die Stielchen-einlenkung herum hell ziegelrot, der Postpetiolus gebräunt, bei einem Exemplar ebenfalls ziegelrot. Mandibeln blaß bräunlich gelb; Fühlerschaft braun, die Geißel hellbraun, ihre distale Hälfte dunkelbraun.

Kopf, Thorax und Petiolus mikroskopisch fein und dicht punktiert, Postpetiolus, Gaster und Beine ebenso gerunzelt-punktiert. Kopf und Gaster matt, die übrigen Teile mäßig, die Beine stärker glänzend.

Auf Kopf und Rücken spärlich einige kurze abstehende Borsten, etwas längere auf Knoten und Gaster.

4 ♀, Guerrero bei Chilapa, 29. X. 1930, L. SCHULTZE.

*Pseudomyrma belli* For. v. *wasmanni* For.

3 ♀, 5,3 mm, Küstengebirge SO-Guerrero, . . . V. 1930, L. SCHULTZE.

In den hohlen Dornen von *Acacia hindsii* Benth.

*Pogonomyrma barbatus* Sm. v. *molefaciens* Buckl.

Eine Anzahl ♀, 7 mm, Mitla (Sierra Mixteca), STOBBE. 1 ♀ Tahuacan, 2 ♂, Cachuila, PURPUS.

*Pheidole absurda* For.

Eine Anzahl ♀, Misantha, GUGELMANN.

*Solenopsis geminata* F.

Zahlreiche ♀, 3—5 mm, Tabasco u. Misantha, GUGELMANN. 12 ♀, 2—7 mm, 3 ♂, 7 mm, Zacnepam, STOBBE.

*Leptothorax striatulus* n. sp.

♀ 2 mm.

Kopf länger als breit, die Seiten parallel, sehr flach konvex, fast gerade, vorn und hinten leicht konvergierend, der Hinterrand