

Explanation of Plate 3.

Figs. 1-7; *Probolomyrmex watanabei* sp. nov.

Fig. 1, Lateral view of mesosoma, petiole and gaster. Fig. 2, Dorsal view of mesosoma and petiole. Fig. 3, Dorsal view of head with right scape. Fig. 4, Frontal view of left mandible. Fig. 5, Labrum. Fig. 6, Maxillary palpus. Fig. 7, Labial palpus.

Long blind ant found in Iwate Pref.

メクラナガアリ岩手県に産す

田 中 将 宏

メクラナガアリ *Stenamma oustoni* WHEELER, 1906 は, "A revision of the genus *Stenamma* of Japan" (YASUMATSU et MURAKAMI, 1960) によれば, 本州(中部地方以西)・四国・九州及び中国大陸の一部から知られているが, 京都大学の吉井良三教授からいただいた標本の中に, 岩手県九戸の内間木洞付近で採集された本種を見出したので, ここに報告する。

本種が現在まで, どの程度採集されているかを正確に知っているわけではないが, 相当稀な種でもあり, おそらくこの報告が北限の記録となるものと思う。

1 worker, near the Uchimagi-do Cave, Kunohe, Iwate Pref., 7. Aug. 1965, leg. R. YOSHI.

なお, 吉井教授のご指摘によれば, 上記論文に記されている本種の採集地の多くが石灰岩地帯に位置し(内間木洞付近も), 即断はできないが或いは本種の分布が石灰岩と何らかの関係があるのではないか, とのことであった。この点については今後の採集調査に期待したい。

未筆ながら, 貴重な助言とともに本種を含め数多くの標本をいただいた吉井教授に謝意を表す。

northern Honshu