

**Situación taxonómica del género *Cataglyphis* Förster, 1850
en la Península Ibérica. I. Las especies del subgénero
Cataglyphis Förster
(Hym. Formicidae)**

POR

A. TINAUT Y J. L. PLAZA

Resumen

En el presente trabajo se realiza un revisión crítica sobre la situación taxonómica de las especies del subgénero *Cataglyphis* citadas para la Península Ibérica. Se propone, hasta una acertada descripción de *C. albicans* y *C. viaticoides*, considerar la existencia en nuestro país únicamente de *C. iberica* y *C. rosenhaueri*. Al mismo tiempo se indica la distribución conocida para nuestro país de los taxones citados de dicho subgénero.

Summary

In the present work, a critical revision of the taxonomic situation of the subgenus *Cataglyphis* species cited in the Iberian Peninsula have been carried out. Even a correct description of *C. albicans* and *C. viaticoides*, proposes the existence in our country of only *C. iberica* and *C. rosenhaueri*. The known distribution of all the taxon cited for our country of that subgenus is also indicated.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo pretendemos aclarar la situación taxonómica de las especies del género *Cataglyphis* en nuestro país y sentar con ello las bases para posteriores estudios sobre el mismo.

El género *Cataglyphis* Förster, 1850 está constituido por hormigas propias de ambientes áridos o semiáridos, pudiendo colonizar los desiertos, no sólo los pedregosos, sino incluso los de arena, ambientes en donde pueden llegar a ser, junto con hormigas del género *Messor*. Forel, 1890, los únicos o prácticamente los únicos seres vivos. Su distribución se limita al hemisferio norte ocupando preferentemente las regiones áridas, si bien algunas especies como por ejemplo *C. bicolor* var. *congolensis*. Stitz, 1916 se introducen algo en el Africa tropical.

En un principio fueron consideradas por FÖRSTER como un subgénero