


1909), estos no se basan en caracteres morfológicos, sino comportamentales, argumento de dudoso valor taxonómico, cuando es el único utilizado.

En nuestro país, de los subgéneros mencionados, tan sólo se encuentran los dos primeros, con un total de quince taxones citados.

Concretamente para el subgénero *Cataglyphis* se han citado los siguientes taxones: *C. albicans* (Roger, 1859) con las siguientes variedades y subespecies: *C. albicans rubra var. rosenhaueri* (Emery, 1906), *C. albicans ssp. ibérica* (Emery, 1906), *C. albicans st. otini* Santschi, 1929, *C. albicans vaucheri var. cana* (Emery, 1906), *C. albicans var. viaticoides* (André, 1881).

Del subgénero *Monocombus* hay citadas: *C. viatica* (Fabricius, 1787), *C. viatica var. velox* Santschi, 1929, *C. viatica var. niger* (André, 1881), *C. viatica ssp. hispánica* (Forel, 1903), *C. viatica hispánica var. nigroides* (Santschi, 1925), *C. altisquamis* (André, 1881), *C. cursor* (Fonscolombe, 1846), *C. cursor var. tibialis* Bondroit, 1918, y *C. pallida* Mayr, 1877.

En este trabajo nos centraremos en las especies del subgénero *Cataglyphis*.



Mapa 1.—Localización de las citas de los diferentes taxones considerados en la bibliografía para la Península Ibérica. Con las líneas remarcamos las áreas de distribución de las dos especies consideradas en este trabajo: (--) *C. rosenhaueri* y (—) *C. ibericus*. (▲) *C. cana*, (☆) *C. otini*, (★) *C. ibérica* (▪) *C. albicans*, (\* ) *C. viaticoides* (✱) *C. rosenhaueri*.