

## POSICION TAXONÓMICA DE LAS ESPECIES CONSIDERADAS

*Cataglyphis albicans* (Roger, 1859): Esta especie fue descrita como perteneciente al género *Formica* Linneo, 1758 a partir de ejemplares procedentes del Norte de Africa, sin precisar la localidad, posteriormente es el mismo ROGER (1863) quien la incluye en el género *Cataglyphis* si bien EMERY y FOREL la mantuvieron en el género *Myrmecocystus* hasta 1912, fecha en la que EMERY acepta la validez de *Cataglyphis* como género independiente, como ya se ha comentado.

De esta especie se han descrito hasta el presente treinta y un taxones distribuidos por todo el norte del continente africano, incluido el Sahara además de Arabia, Irán y Turquía. En la Península Ibérica han sido citadas seis de ellas fundamentalmente de la mitad oriental. (Mapa 1).

Como hemos dicho en la introducción la mayoría de los taxones descritos para esta especie están sin revisar y los caracteres indicados para separarlos son en muchas ocasiones difíciles de objetivar, tan sólo, que conozcamos, han sido elevadas a nivel de especie de una forma razonada: *C. fortis* Forel, 1902 (antes *C. albicans* var. *fortis*) por WEHNER, R. (1983) y *C. semitonsa* Santschi, 1926 (antes *C. albicans* var. *semitonsa*) por TOHME y TOHME (en COLLINGWOOD, 1985).

Como indicaremos más adelante, se trata de una especie lo suficientemente variable como para que se hayan descrito de ella una elevada cantidad de taxones infraespecíficos. Al mismo tiempo esta variabilidad en caracteres sutiles y poco estables, impide encontrar diferencias de peso que permitan valorar e identificar correctamente a cada una de las variedades, subtipos, etc., averiguar su distribución y por tanto su verdadero estatus taxonómico.

Además esto origina el que diferentes autores que trabajan sobre zonas diferentes, hablen aparentemente de la misma especie pero sin embargo, al describirla, esta descripción no coincida, como así ocurre con la descripción de la genitalia dada por EMERY (1906), WEHNER (1983) o los comentarios que realiza COLLINGWOOD (1985) sobre los ejemplares procedentes de Arabia. Por esta razón y hasta que no se redescrba la especie tipo y se establezcan sus límites de variabilidad no sabremos hasta que punto las citas de *C. albicans* de nuestra península corresponden realmente a esta especie.

**C. rosenhaueri** (Emery, 1906) y **C. viaticoides** (André, 1881): La situación de ambas especies va muy ligada por lo que las trataremos en común.

*C. viaticoides* fue denominada y brevemente descrita a partir de unos ejemplares procedentes de Beirut y que ANDRÉ había comprobado eran idénticos a la variedad indicada, pero no nominada, por MAYR (1870), de Sevilla.

FOREL en su trabajo sobre las hormigas de Orán (1894), al hablar sobre *C. albicans* dice que en El Wreider no existe más que la variedad roja, a la que identifica como *viaticoides* indicando además que ésta vive también en Túnez. Es decir amplía el área de distribución de este especie. En un trabajo posterior (1902) vuelve a citar a esta variedad de diferentes puntos del Sahara Argelino.

EMERY en su revisión sobre el género realizada en 1906, describe a la var. *rosenhaueri* de *C. albicans* *ruber* (Forel, 1903) a partir de ejemplares proce-