

porta es que siguen considerando a ambos taxones de dos puntos geográficos diferentes.

ARNOLDI (1964) describe a las tres castas de *C. viaticoides*, siendo además la primera vez que aparece en la bibliografía a un nivel taxonómico de especie. Los ejemplares citados por ARNOLDI en este trabajo proceden de la URSS.

En la Península Ibérica la primera cita para esta especie que tenemos registrada procede de MEDINA (1891) para diferentes localidades de Andalucía, siendo identificados todos los ejemplares como *Myrmecocystus albicans* var. *viaticoides* ya que se apoyó en la obra de ANDRÉ (1881); FOREL en 1895 la vuelve a citar de Sevilla, seguramente influenciado también por los comentarios de ANDRÉ (op. cit.). En 1906 sabemos que es descrita la variedad *rosenhaueri* por EMERY a partir de ejemplares procedentes de España meridional, ignorando dicho autor las alusiones de MAYR y ANDRÉ, e incluso las citas de MEDINA sobre *viaticoides*.

A partir de entonces han sido citadas indiscriminadamente tanto una como otra especie para la Península, concretamente las citas por orden cronológico que poseemos son las siguientes: FOREL (1909): *C. viaticoides*; SANTSCHI (1925): *C. rosenhaueri*; COLLINGWOOD y YARROW (1969): *C. viaticoides* y *C. rosenhaueri*; DE HARO y COLLINGWOOD (1977): *C. viaticoides*; ACOSTA (1978): *C. viaticoides*; TINAUT (1981): *C. viaticoides*; RODRÍGUEZ (1982): *C. viaticoides*; REYES (1985): *C. viaticoides*; MARTÍNEZ y ESPADALER (1986): *C. rosenhaueri* y PASCUAL (1986): *C. viaticoides*.

C. albicans st. **otini** Santschi, 1929: Esta variedad descrita de Rabat, es diferenciada de *albicans* por tener la cabeza no completamente negra, sino rojiza, sobre todo el extremo anterior, así como por tener la cabeza y el tórax menos brillante que en el tipo.

Ha sido citada de la Península tan sólo por SANTSCHI (1931) de Vicalvaro (Madrid) aunque con dudas, pensando dicho autor que quizás fue un error de etiquetado. No vuelve a ser citada de nuevo, aunque si es recogida esta cita de SANTSCHI por CEBALLOS (1956) y COLLINGWOOD (1978), entre otros.

Cataglyphis vaucheri var. **cana** Emery, 1906: Especie descrita de Marrakech, establecida también por tener la cabeza, el tórax, peciolo y apéndices de color rojo oscuro.

Citada de la Península exclusivamente por SANTSCHI (1925 y 1929) de diferentes localidades del centro de la Península y Portugal, habiendo sido recogidas estas citas posteriormente también por CEBALLOS (1956) y COLLINGWOOD (1978).

Cataglyphis albicans ssp. **iberica** (Emery, 1906): Descrita como propia de España y Portugal, se caracteriza por la cabeza un poco más alargada que en *albicans* y por la genitalia diferente de la del tipo.

Ha sido citada por muy diferentes autores prácticamente de toda la Península. Según CERDA, X. (1987) se distribuye por todo el litoral mediterráneo español.

Si bien diferentes autores (COLLINGWOOD y YARROW, 1969; ESPADALER, 1986; MARTÍNEZ, 1984 y 1987 y CERDA, 1987, entre otros) la consideran a ni-