

А. Ф. Вацкевич.

преподаватель зоологии Томского Университета.

On the ent. fauna of north Tobolsk. Province.

К фауне муравьев севера Тобольской губ.

В Зоологическом Кабинете Томского Университета имеется небольшая коллекция муравьев, собранная покойным доктором С. М. Чугуновым, летом в 1915 году на пространстве: начиная от с. Репнёвского на р. Иртыш и кончая окрестностями г. Обдорска. Тоже что указанная местность представляет типичную тайгу, состоящую из кедра, лиственницы с примесью бересмы, осины и рябины. На севере тайга незаметно переходит через пояс криполесья в тундру.

Крайний пункт сбора муравьев, Обдорск, расположен на северном полярном круге; у южной окраины тундры, на правом берегу реки Погла, склон которого, высотою от 15—20 саж., густо покрыт деревьями: ольхой, бересмой, черемухой, елью, рабиной, ивами, а также кустарниками: красной смородиной, малиной и шиповником. Но достаточно подняться по лесистому склону на верхнее плато, как сейчас же начинается мохового лишайниковая бобковатая тундра с редкими приземистыми лиственицами, группами коряевых берез и зарослями тальников по испадинам и сырьим ложбинам. Следовательно Обдорск находится еще в пояссе лесо-тундры, хотя в северной ее части.

Коллекция, собранная д—ром Чугуновым, была передана мне проф. М. Д. Русским для определения. Хотя она не велика, так как содержит всего 10 форм (видов, рас и разновидностей), но представляет несомненный интерес в отношении чисто зоографическом, так как заключает в себе формы муравьев, обитающих как на крайнем севере Европы, так отчасти и в центральноазиатском нагорье.

Нужно заметить, что мирмекологическая фауна севера Азии остается до сих пор совершенно не изученной.

Имеющиеся в литературе указания¹⁾ о муравьях севера не вдут далее 62° северной широты.

Одна разновидность новая.

CAMPONOTINAE

1. *Camponotus herculeanus* L.

Одна бескрылая самка красногрудого кампонотуса была взята в Березовском уезде, на Оби под доской 1. VII и двадцать четыре экземпляра рабочих в Тобольском уезде в окр. с. Репнёвского на левом берегу реки Иртыша, на бревнах 12. VI.

Это типичная лесная форма, свойственная северным и умеренным широтам Стального Света. В своем географическом распространении *Camponotus herculeanus* заходит далеко на север. Что же касается нахождения этого древоточца в тундре, то этот вопрос еще до сих пор остается открытым.

¹⁾ Проф. М. Д. Русский. "Муравьи Сургутского уезда Тобольской губернии". Русск. Энтом. Обозр., т. XIV, 1914, № 1.