

2. *Formica rufa* L. (s. str.)

## Рыжий лесной муравей.

Повидному обыкновенен для всей Тобольской губернии.

Местонахождения: Березовский уезд, на Оби под доской (I. VII. семь рабочих); с Кушеванск. 7. VI двадцать восемь рабочих; с Кондинское (I. VIII. десять рабочих); Сургутский уезд, „Юрты Пирчмы“, на лев. бер. Оби (7. VI шестнадцать бескрылых и одна крылатая самка).

Населяет всю Европу, кроме самых ее южных окраин, Кавказ и всю лесную, лесостепную и горно-таежную полосу Сибири, Алтай, Амурский край, Сахалин, Камчатку.

3 *Formica rufa pratensis* Degeer.

Найдены в количестве двенадцати экземпляров рабочих в окр. с. Кушеванск. 7. VII.

Проф. М. Д. Рузский указывает для Пермской губ., ок. оз. Сары-Кули, Симбирска и Казани. 1).

4. *Formica exsecta* Nyl. (s. str.)

## Красный тонкоголовый муравей.

Тридцать три экземпляра рабочих этого широкораспространенного в Сибири муравья взяты в окрестности Березова 5. VII. Географическое распространение тонкоголового муравья довольно обширно, обнимающая всю северную и среднюю Европу, Урал, Кавказ и Сибирь.

5. *Formica fusca* L. (s. str.)

## Чернобурый лесной муравей.

Взяты только рабочие этого вида.

Местонахождения: Березовский уезд, на Оби под доской (двадцать шесть рабочих 12. VII); с. Кондинское (восемь рабочих 16. VI), с. Кушеванск (один рабочий 7. VII); Ворнинский Юрты (пять рабочих 17. VII); Тобольский уезд, с Репеловское на левом берегу р. Иртыша (один рабочий 12. VI). Широко распространен в лесах всей Европы, на Кавказе, Урале, Китае, Японии и частью в центральной Азии.

6 *Formica fusca* L. var *borealis* nov. var.

Рабочий отличается от типичной формы строением заднеспинки, имеющей небольшую выемку (углубление) по середине основной ее поверхности. На pronotum 5—6, а на mesonotum 1—2 золотистого цвета отстоящих волоска. Такие же волоски находятся и на верхней и нижней поверхности брюшка. У половины взятых экземпляров на верхнем крае чешушки имеется небольшая вырезка.

Структура и прочие признаки, как у типичной формы.

Длина тела 5,4—8 мм.

По строению заднеспинки эта форма напоминает разновидность *Formica fusca rices* Nyl. var. *inplana* Ruzsky и по всей вероятности является переходной формой к последней, которая в настоящее время из-

1) М. Рузский „Муравьи России“ Казань (1905) стр. 367.