

вестна только из центрально азиатского нагорья (верховья р. Голубой, Кам и Шандам) в Камчатки.

Местонахождения: Березовский уезд, на Оби под доской (шесть рабочих I. VII); с. Кондинское (семь рабочих 16. VII); Воронинские юрты (семь рабочих 17. VII).

Arbeiter unterscheidet sich von der typischen Form durch den Bau des Metanotums, welches eine kleine Vertiefung in der Mitte seiner basischen Oberfläche hat. Auf dem Pronotum befinden sich 5–6 auf dem Mesonotum 1–2 abstehende Härtchen von goldiger Färbung. Ebensoleche Härtchen befinden sich auch auf der oberen und unteren Oberfläche des Abdomens. Bei der Hälfte der erbeuteten Exemplarein der Platte ein kleiner Ausschnitt. Struktur und übrige Merkmale wie beider typischen Form. Körperlänge 5,4–8 mm.

Im Bau d-s Metanotums erinnert diese Form an *Formica fusca riezae* Nyl. var. *implana* Ruzsky und ist wahrscheinlich eine Übergangsform zur letztern, welche zur Zeit nur aus dem Zentralen Hochasien (überer Lauf des Blauen Flusses, Kham und Zaidam) und Kamtschatka bekannt ist. Fundort: Gouv. Tobolsk., Kreis Bergesow, am Flusse Obj unter einem Frett (6. Arbeiter. VI). Kirchdorf Kondinskoje (7 Arbeiter 16. VII); Weroninsche Jurten (7 Arbeiter 17. VII).

7. *Formica fusca gagatoides* Ruzsky.

Шесть экземпляров рабочих взяты на сухой тундре в окрестностях Обдорска 10. VII.

До настоящего времени этот муравей был найден только на крайнем севере Европейской России (Архангельская губ., Лапландия, Мурман¹) и северной и восточной частях Тибета².

8. *Formica sanguinea* Latr.

Муравей кровавый или рабовладелец

Шесть экземпляров рабочих кровавого рабовладельческого муравья найдены в окрестностях Березова 5. VII.

Вид палеарктический. Распространен во всей северной и средней Европе на Кавказе, Сибири и сев.-вост. Тибете. Нахождение *Formica sanguinea* в окрестностях Березова, далеко на севере (63° 45') втайге представляет особенный интерес в том отношении, что в Сибири он свойствен преимущественно средней и южной ее полосе, где населяет разнотипные лиственные леса, сосновые боры, кустарникодорожную и каменистую степь, или южную прореженную полосу тайги.

MYRMICINAE

9. *Myrmica ruginodis* Nyl.

Один экземпляр рабочего был взят в Березовском уезде, окр. с. Кондинского 16. VII.

Распространена эта мирмика по всей северной и средней Европе, на Кавказе, Сибири и Туркестане.

¹ М. Рузский „О муравьях Архангельской губ.“ Изв. Русск. Географ. Общ., 1904 г.

² М. Д. Рузский „О муравьях Тибета и Южной Гоби“. Отт. из Ежегодника зоологич. Музея Акад. Наук., т. XX, 1915.