

## Tafel VII.

- Fig. 1. *Anergatides Kohli* Wasm. ♂ (14:1). (Aufnahme in feuchter Kammer. Leitz Microsumm. 35 mm, Projektionsokular 2\*.)  
1, 2, 3 = erstes bis drittes Dorsalsegment des Hinterleibes.
- Fig. 2. Fühler des ♂ (33:1). (Alaunkarminfärbung, Kanadabalsampräparat. Zeiss AA, Projektoc. 2\*.)
- Fig. 3. Fühler des ♀ (33:1). (Das übrige wie in Fig. 2.)
- Fig. 4. *Anergatides Kohli* Wasm. ♀, Seitenansicht (15:1). (Trockenpräparat, Leitz Mikros. 35, Projektoc. 2\*.)  
1, 2, 3 = erstes bis drittes Dorsalsegment.
- Fig. 5. Vorderbein des ♀ (27:1). (Ungefärbtes Kanadabalsampräparat. Zeiss AA, Projektoc. 2\*.)
- Fig. 6. Hinterbein des ♀ (27:1). (Das übrige wie in Fig. 5.)
- Fig. 7. *Anergatides Kohli* ♀, Oberansicht (15:1). (Das übrige wie in Fig. 4.)
- Fig. 8. Oberansicht des Vorderkopfes des ♀ (30:1). (Trockenpräparat, Leitz Mikros. 24, Projektoc. 2\*.)  
K = Oberkiefer; O = Oberlippe.
- Fig. 9. Oberansicht des Vorderkopfes des ♂ (30:1). (Das übrige wie in Fig. 8.)

## Tafel VIII.

- Fig. 10. Vorderbein des ♂ (27:1). (Ungefärbtes Kanadabalsampräparat. Zeiss AA, Projektoc. 2\*.)
- Fig. 11. Kamm an der Spitze der Vorderschiene des ♂ (166:1). (Alaunkarminfärbung, Kanadabalsampräparat. Zeiss D, Projektoc. 2\*.)
- Fig. 12. Hinterbein des ♂ (27:1). (Das übrige wie in Fig. 10.)
- Fig. 13. Vorderflügel des ♀ (26:1). (Trockenpräparat<sup>1</sup>). Zeiss AA, Projektoc. 2\*.) Die rudimentären Adern, die zahlreichen mikroskopischen Härchen und die Randwimpern sind deutlich sichtbar.
- Fig. 14. Hinterflügel des ♀ (26:1). (Das übrige wie in Fig. 13.)
- Fig. 15. Rudimentärer Vorderflügel des ♂ (160:1). (Eosinfärbung, Kanadabalsampräparat. Zeiss D, Projektoc. 2\*.)
- Fig. 16. Oberkiefer des ♂ (210:1). (Alaunkarmin-Eosin-Färbung, Kanadabalsampräparat, Zeiss D, Projektoc. 2\*.)
- Fig. 17. Oberkiefer des ♀ (210:1). (Das übrige wie in Fig. 16.)
- Fig. 18. Oberlippe des ♂ (175:1). (Das übrige wie in Fig. 16.)
- Fig. 19. Unterlippe und Unterkiefer des ♂ (175:1). (Das übrige wie in Fig. 16.)  
l = Unterlippe; m = Unterkiefer; p = Kiefertaster.
- Fig. 20. Unterlippe und Unterkiefer des ♀ (175:1). (Das übrige wie in Fig. 19.)

\*) Unter Deckglas, aber nicht in Kanadabalsam eingebettet, da sonst die Strukturdetails undeutlich werden. Aufnahme mit geschlossener Irisblende!