

pallide virens, tubo breviter ovato; lobis rotundatis, conniventibus, antheras velantibus. FRUCTUS....

Oritur in sylvis subhumidis provinciae *Yungas* Boliviæ cis-Andinæ circiter ad altitudinem 1500 metr. Decembri floret. (*Cat. nostr.*, n° 4257.)

14. COCCOLOBA BLANCHETIANA †.

FRUTEX scandens? ramis patulis brunneo-cinerascentibus; ramulis gracilibus striatis glabris. FOLIA ovata, 6-10 cm. longa, 4-6 cm. lata, breviter acuminata, obtusiuscula, basi cordata, rigidula, utrinque glaberrima; petiolo 10-15 mm. longo. OCHREÆ laxiusculæ, intermedie breviores, oblique truncatæ, haud diu persistentes. RACEMI foliis breviores, ramulis lateralibus foliatis continui: rachi glabra. FLORES... FRUCTUS in pedicellis patentibus 2-3 mm. longis, ovati, utrinque acuminati.

Crescit in provincia *Bahia* Brasiliæ prope *Jacobina*. — V. S., Herb. Mus. Par. et Lessert. (Blanchet, *pl. exs.*, n° 3561.)

15. COCCOLOBA POPULIFOLIA †.

Frutex scandens? glaber, ramis cylindraceis, striatis, epidermide brunneo-cinerascente vestitis. FOLIA rotundata aut late obovata, 8-12 cm. longa, 7-12 cm. lata, brevissime acuminata, basi cordato-subpeltata, subinembranacea, costa venisque primariis secundariisque supra leviter impressis, subtus villosiusculis; petiolo 20-25 mm. longo. OCHREÆ membranaceæ valde oblique truncatæ ad apicem ramulorum floriferarum ut plurimum persistentes, cæterum mox cadentes. RACEMI cylindrici, multiflori, folia vix æquantes, in apice ramulorum brevissime pedunculati, basi ochreis persistentibus involucrati; bracteis minimis ovato-rotundis subunifloris rachique carnosiuscula striata glabriusculis. FLORES brevissime pedicellati, ochreolis infundibuliformibus basi arcte involucratis. Fructus....

Nascitur in provincia *Bahia* Brasiliæ orientalis. — V. S., Herb. Mus. Par.; Lessert. — (Blanchet, *pl. exs.*, n° 4486 et 4646.)

16. COCCOLOBA PLANTAGINEA †.

FRUTEX scandens, ramis elongatis cylindricis striato-sulcatis, epidermide cinerascente vestitis. FOLIA obovato-oblonga, 6-8 cm. longa, 3-4 cm. lata, obtusa, basi attenuata, coriacea, margine parum revoluta, glaberrima, costa venisque primariis vix eminentibus, aliis immersis. OCHREÆ oblique truncatæ, haud diu persistentes. Racemii ramulis brevissimis