

brevissimo tenuiter puberulo. OCHREÆ breves truncatæ. RACEMI foliis breviore, plerumque terminales, breviter pedunculati; rachi gracili, pubescente; bracteis minimis subunifloris. FLORES pedicellos subnudos 1 mm. long. subæquantes; perianthii tubo brevi, lobis ovatis patentibus; antheris breviter exsertis. FRUCTUS....

Ex provincia *Bahia* Brasiliæ littoralis. — V. S., Herb. Mus. Par. (Blanchet, pl. exs., n° 2421).

## 20. COCCOLOBA OCHREOLATA †.

FRUTEX scandens? ramulis flexuosis, leviter striatis, cylindraceis, glabris. FOLIA rotunda aut rotundato-ovata 6 ½-9 cm. longa, 5-8 cm. lata, obtusissima, rarius brevissime acuminata, rigidula, undulata, glaberrima; costa venisque paginæ superioris impressis, subtus prominulis. OCHREÆ membranaceæ, oblique truncatae, basim ramulorum floriferarum laxe vaginantes, brevi tempore persistentes. RACEMI foliis subæquantes, in apice ramulorum breviter pedunculati, patentes; axi bracteisque (2-3 floris) glabris. FLORUM pedicelli patentes 1-3 mm. longi, ochreolis quam in aliis speciebus conspicuoribus, infundibuliformibus, apice bitrifidis involucrati; perianthii tubo basi attenuato, lobis ovatis patulo-recurvis; staminibus exsertis.

Nascitur in provincia *Bahia* Brasiliæ maritimæ. — V. S., Herb. Mus. Par. et Lessert (Blanchet, pl. exs., n° 3410).

## 21. COCCOLOBA SALICIFOLIA †.

FRUTEX scandens, ramis cylindricis verruculosis, ramulis flexuosis tenuiter striatis glabris. FOLIA numerosa, lanceolata, 6-10 cm. longa, 20-25 mm. lata, leviter acuminata, obtusiuscula, basi breviter attenuata, membranacea, glaberrima, venis vix prominulis. OCHREÆ membranaceæ internodiis breviore, mox deciduae. RACEMI graciles, flexuosi, folia subæquantes, laxiflori: rachi tenui striata glabra; bracteis ovatis, 1 mm. longis, bifloris. FLORES breviter pedicellati: pedicellis ochreolis longioribus; perianthii tubo brevissimo, lobis ovatis; antheris vix exsertis. FRUCTUS....

Crescit in provincia *Rio de Janeiro* Brasiliæjuxta Novo-Friburgo.—V. S., Herb., Lessert (Claussen).

## 22. COCCOLOBA CUJABENSIS †.

FRUTEX scandens? cortice cinereo; ramulis cylindricis apice striatis ramulisque glabris. FOLIA ovato-oblonga aut oblonga, 6-10 cm. longa, 3-6 cm. lata, basi cordato-subpeltata, submembranacea, supra gla-