

striato-sulcato. FOLIA oblonga, 6-10 cm. longa, 3-5 cm. lata, breviter acuminata, basi rotundata aut acutiuscula, coriacea, supra glaberrima (sicca glaucescentia), subtus tenuissime puberula : venis primariis crassis prominulis intra marginem anastomosantibus, secundariis eleganter reticulatis. Petiolus 10-15 mm. longus. OCHREÆ breves, oblique truncatæ, mox evanidæ. RACEMI flexuosi, foliis longiores, ramulis axillaribus brevibus continui, graciles, laxiflori : rachi subglandulosa ; pedicellis patentibus perianthio brevioribus ; bracteis minimis subbifloris. FLORES 2 mm. vix metentes ; staminibus inclusis ; stigmatibus subexsertis. PERIGONIUM FRUCTIFERUM ovoideum, diametro 4 mm. ACHENIUM subglobosum, obscure trigonum.

Habitat in provincia *Minas-Geraes* Brasiliæ.—V. S., Herb. Mus. Par. et Lessert. (Claussen, pl. exs., n° 280.)

26. COCCOLOBA POLYSTACHYA †.

ARBOR 3-4 metralis, trunco gracili erecto ; ramis patentibus, cylindricis, basi brunneo-cinereis, apicem versus herbaceis. FOLIA omnia rotundato ovata vel superiora oblongo-ovata, 1-3 dm. longa, 8-12 cm. lata, aut majora, breviter acuminata, basi cordata, membranacea, supra glabrata, subtus costa et venis utriusque paginæ petioloque 15-35 mm. longo pubescentibus. OCHREÆ foliaceæ, laxissimæ, internodiis junioribus multum longiores, extus pubescentes. RACEMI in apice ramorum numerosi (12-30), paniculati, graciles ; axi bracteisque ovatis subbifloris pubescentibus. FLORES breviter pedicellati viridescentes. PERIANTHI tubus brevis ochreola rupta laxe involucratus ; staminibus exsertis. FRUCTUS.....

Nascitur in sylvis primævis provinciæ *Matto-Grosso*, juxta vicum *Villa-Maria* dictum, in Brasilia centrali. Julio floret. — V. V. (*Cat. nostr.*, n° 3381); et S., Herb. Mus. Par. (*Mart.*, *Herb. flor. bras.*, n° 1242).

Nota. L'espèce suivante est des Antilles ; elle est cultivée, depuis bien des années, dans les serres, sous le nom de *Coccoloba rugosa*, mais elle n'a été bien caractérisée nulle part. Dans l'herbier de Vaillant, actuellement en possession de M. Delessert, je l'ai encore vue désignée par les noms de *C. macrophylla*, de *C. magnifolia*, Jacq. (synonyme du *C. pubescens*), et enfin par celui de *C. bullata* qu'on aurait pu lui conserver, comme rendant bien l'aspect si particulier de ses feuilles, si le nom de *C. rugosa* n'était déjà consacré par une petite phrase de Desfontaines, enfouie dans le catalogue des plantes du Jardin botanique de Paris. (Éd. III, p. 389.)