

olivaceum, faciebus late ellipticis, abrupte acuminatis, e basi versus apicem fastigiatim nervosis.

Crescit in viciniis *Guayaquil* reipublicæ Equatoris. — V. S., Herb. Lessert. (Gaudichaud, pl. exs., n° 3.)

### 33. TRIPALARIS POEPPIGIANA †.

ARBOR? ramulis glabris. FOLIA oblonga, 2-3 dm. longa, 8-11 cm. lata, acuminata, breviter petiolata, subcordacea, utrinque glaberrima costave juniorum pilis quibusdam longis adpressis instructa. INFLORESCENTIA foliis longior? : ramis patulis puberulis, bracteis extus adpresso pilosis, pedicellis dense ferrugineo-tomentosis. PERIANTHUM fructiferum 5-6½ cm. longum, tubo oblongo, extus intusque adpresso pubescenti-piloso ; laci- niis exterioribus lanceolatis, obtusis, utrinque pilosiusculis, sinu lato basi separatis ; laciiniis interioribus lanceolatis, fructum æquantibus, quasi discretis, pagina interiori ferrugineo-pilosus. ACHENIUM trialatum, in specimine unico suppetenti tubo multum brevius : faciebus ovato-oblongis, acuminatis.

Crescit in provincia *Maynas* Peruviae (Poeppig). — V. S., Herb. Mus. Par.

### 34. TRIPALARIS GARDNERIANA †.

ARBOR? ramulis striatis glabris. FOLIA ovato-oblonga, 8-15 cm. longa, 5-7 cm. lata, breviter acuminata, basi vix attenuata, integerrima, sub- membranacea, glabra aut pilis rarissimis conspersa costaque subtus adpresso pilosa, margine ciliata. INFLORESCENTIA foliis subæqualis, ramis paulo patentibus bracteisque pubescenti-pilosus. PERIANTHUM fructiferum 15-35 mm. longum, tubo ovato, extus pubescenti-piloso, intus glabriusculo ; laciiniis exterioribus lanceolato-spathulatis, obtusis, sinu linearis basi sejunctis, utrinque leviter pubescentibus ; laciiniis interioribus linearis-spathulatis, achenii apicem haud attingentibus, perianthii basi adnatis, inferne pilosiusculis, cæterum glabris. ACHENIUM late ovato-trialatum pallide cinnamomeo-olivaceum : faciebus ovatis, acuminatis, transverse profunde concavis, e basi ad apicem fastigiatim costulatis.

Provenit in provincia *Ceara* Brasiliæ septentrionalis. — V. S., Herb. Mus. Par. (Gardner, pl. exs., n° 1629).

### 35. TRIPALARIS TOMENTOSA †.

ARBOR ramulis striatis glabratis. FOLIA ovata, quæ vidi 10-15 cm. tan- tummodo longa, 4-7 cm. lata, apice attenuata acuta, basi emarginato- subcordata, integerrima, coriacea, pilis mollibus raris supra inspersis, subtus dense pubescenti-tomentosa, costa petioloque (supra) pubescenti pilosis. INFLORESCENTIA maxima foliis intermixta, ramis patentibus; brac- teis ovatis pedicellisque tomentoso-pilosus. PERIANTHUM fructiferum