

Camponotus (*Myrmentoma*) *sicheli* Mayr (Majorca and Iviza).

Menozzi's list contains the following, all from Majorca, not recorded in Lomnicki's and my list:

Ponera eduardi Forel.

Ponera coarctata Latreille subsp. *lucida* Emery.

Solenopsis fugax Latreille.

Tetramarium caespitum meridionale Emery.

Acantholepis frauenfeldi Mayr var. *nigra* Emery.

Camponotus (*Colobopsis*) *truncatus* Spinola.

The number of forms now known from the Balearic Islands is therefore 26. They show clearly, as Menozzi has remarked, that the fauna is Iberian („Ein kleines Bruchstück der reicherer und mannigfaltigeren des benachbarten Spaniens“). It is certainly depauperate, comprising no endemic species, though there are the following endemic subspecies and variety:

Aphaenogaster testaceopilosa gemella.

Crematogaster auberti laestrygon var. *submaura*.

Solenopsis latro fairchildi.

Camponotus lateralis armouri.

Deux nouvelles fourmis parasites de l'Argentine

par le Dr. Santschi (Kairouan, Tunisie).

(1 figure dans le texte.)

Genus: *Oxyepoecus* n. gen.

♀ Tête rectangulaire un peu allongé. Yeux moyens sur les côtés. Epistome bicaréné et bidenté à lobe antérieur saillant. Mandibules triangulaires de 4 dents. Antennes de 11 articles, massue de 3 articles, le dernier d'un tiers plus long que l'ensemble des deux précédents, les 2 à 7 du funicule transversaux. Crêtes frontales assez courtes, rapprochées vers leur partie lobée, Thorax assez robuste, Pronotum aussi large que la tête, épaulé, sa face antérieure verticale, non recouverte par le mésonotum. Epinotum armé de deux fortes épines, à base comprimée. Noeud du pétiole, aussi haut que large et que la longueur de son pédicule. Postpétiole en ovale transversal, plus bas que le pétiole. Gastre court, échancré à la base. Pattes de longueur moyenne. Ailes à cellule médiane complète, les cellules radiales et cubitales seulement ébauchées.

Oxyepoecus bruchi n. sp.

♀ Long; 2,2 à 2,4 mm. D'un brun rougeâtre moyen, le gastre noirâtre, le devant de la tête plus roussâtre, antennes et pattes ocre clair. Lisse. Luisante. Tête striée ponctuée des lobes frontaux au vertex avec une bande lisse médiane. Face postérieure du postpétiole finement rugueuse. Dessus du pronotum et face déclive de l'épinotum faiblement ridée en travers. Partout des points pilifères épars. Une pilosité fine, assez régulière et abondante mais plus courte et plus oblique sur la tête et les appendices.

Tête environ un sixième plus longue que large, à côtés parallèles, ou faiblement convergent en avant, le bord postérieur convexe ainsi que les angles.