

commune dans Formose et dans la Chine.

Sous-famille Formicinae

7. *Anoplolepis longipes* (Jerdon)

*Formica longipes* Jerdon, Madras Journ. Litt. Sci., 17, p. 122, 1851.

Plusieurs ouvrières, 21. VII. 1934, Sonai-Hoshitate, l'île Iriomote, M. Esaki leg.

Plusieurs ouvrières, VIII–XII, 1939, l'île Ishigaki, M. Masaki leg.

Cette espèce est nouvelle pour la faune des îles de Yaeyama et très commune. Elle est cosmopolite dans les régions tropicales, subtropicales et tempérées.

8. *Camponotus (Tanaemyrmex) siemsseni* Forel

*Camponotus (Tanaemyrmex) siemsseni* Forel, Mitt. Naturh. Mus. Hamburg, 18, p. 70, 1901.

1 ouvrière, 4. IX. 1934, l'île Ishigaki, M. Masaki leg.

1 femelle, 5. VII. 1934, Sonai-Urabudake-Hinai, l'île Yonakuni, M. Esaki leg.

Cette espèce n'était pas signalée des îles de Yaeyama et existe dans Formose.

9. *Camponotus (Tanaemyrmex) variegatus* (F. Smith) var. *dulcis* Emery

*Camponotus mitis* var. *dulcis* Emery, Ann. Mus. Stor. Nat., (2), 7, p. 511, 1889.

1 ouvrière, 5. VII. 1934, Sonai-Urabudake-Hinai, l'île Yonakuni, M. Esaki leg.

Cette espèce est nouvelle pour la faune de la faune des îles de Yaeyama. En Extrême-Orient cette fourmi est répandue dans la Chine du Sud et Formose.

10. *Polyrhachis (Myrmhopla) dives* F. Smith

*Polyrhachis dives* F. Smith, Journ. Proc. Linn. Soc. London (2), p. 64, 1857.

*Polyrhachis dives* Matsumura et Uchida, Ins. Mats., 1, no. 1, p. 52, 1926.

Plusieurs ouvrières et 2 femelles, l'île Ishigaki, M. Masaki leg.

Cette espèce signalée dans l'île Ishigaki et l'île Okinawa est très commune dans toutes l'île Ishigaki. En Extrême-Orient elle est très répandue à Formose, dans l'île Hainan, l'île Botel-Tobago, l'île Kasho, des îles de Pescadores, et dans la Chine méridionale et orientale.

11. *Paratrechina (Paratrechina) longicornis* (Latreille)

*Formica longicornis* Latreille, Hist. Nat. Fourmis, p. 113, 1802.