

*Medidas:*

Long. total .....	7 mm	Long. del escapo .....	2 mm
Eje máximo de la cabeza ..	2 mm	Long. del tórax .....	2.5 mm
Eje mínimo de cabeza .....	1.5 mm	Long. del gáster .....	2 mm

*Hembra.* Coloración general castaño-rojizo o castaño oscuro; tegumento rugoso, reticulado, pubescente. Cabeza cuadrangular; espinas occipitales pequeñas; ojos medianos redondos, convexos; ocelos en número de tres bien marcados en una prominencia; antenas de once antenitos, con el escapo y el flagelo igual que la obrera; sutura occipital con tubérculos. Tórax muy convexo con las espinas pronotales inferiores vestigiales; espinas pronotales laterales bien desarrolladas; escudo grande, globoso; escutelo pequeño subrectangular con los ángulos inferiores romos; alas hialinas, ligeramente castañas con nervaduras castaño-rojizas, tenuemente pubescentes; ala posterior con once ganchos (1); epinoto con las espinas grandes y agudas; pecíolo y postpecíolo con muy pocos tubérculos.

Primer tergito del gáster, (4º abdominal) reticulado y los demás tergitos con una zona anterior brillante, más clara y una zona posterior reticulada y más oscura. (Fig. 12.)

*Medidas:*

Long. total .....	12 mm	Long. del escapo .....	2 mm
Eje máximo de la cabeza ....	2 mm	Long. del tórax .....	3.5 mm
Eje mínimo de la cabeza ....	2 mm	Long. del gáster .....	4 mm

*Macho.* Coloración general negra, tegumento de la cabeza y el tórax opaco y reticulado; el gáster se presenta brillante y finamente punteado. Cabeza pequeña, cuadrangular; mandíbulas bien desarrolladas; carenas frontales marcadas; ojos grandes, convexos; carena ocular bien marcada; antenas de trece antenitos, escapo cubierto de pelos, ligeramente curvado en la zona proximal y ensanchado en la zona distal; la cabeza no presenta espinas occipitales. Tórax globoso, espinas pronotales inferiores vestigiales; espinas pronotales laterales muy poco desarrolladas; escudo grande y convexo; escutelo pequeño, convexo con dos tubérculos posterolaterales; alas hialinas finamente pubescentes, téngula bien desarrollada; ala posterior con diez ganchos; espinas epinotales bien desarrolladas; pecíolo con espinas tuberculadas; gáster pubescente y brillante. La genitalia del macho, fuerte, gonostilos recurvados, anchos, externamente presentan una zona excavada; valvas del pene laminares, esclerificadas; la volsella presenta el digitus ancho y en la curvatura un pequeño diente que muestra la diferencia que hay entre *A. hispidus* y *A. lobicornis*. (Figs. 10 y 11.)

(1) Kusnezov (1962) da para la hembra entre 8 y 9 ganchos.