

Maroc. Reraïa. ♀ < ♂.

*Messor structor* Latr.

Marseille, — Madrid, — Aranjuez ♀—♀. — Les petites ♀ ont la tête lisse et les grandes atteignent 9 mm. Maroc: Azrou, légère variété.

*Messor structor* Latr. v. *ibericus* Em.

Vicalvaro, ♂. Aranjuez, ♂♀.

Le mâle est petit, ne dépassant pas 7,5 à 8 mm.

*Messor abdelazizi* Sants.

♀ (minor, non décrite) Long: 6 mm. Tête plus étroite que le gastre, un peu plus longue que large. L'angle de l'épinotum mousse. Tête plus finement, mais aussi régulièrement striée. Fave occipitale lisse. Couleur et pilosité comme chez la grande ouvrière. Ressemble à *M. semoni* For. de même taille, mais celle-ci a la tête plus mate avec une dense et fine ponctuation entre les stries et sur les angles postérieurs, ponctuation qui manque chez *abdelazizi*.

♀. Long: 12 mm., aile antérieure longue de 15 mm. La tête est fortement striée en long même sur la face occipitale. Les milieux du mésonotum et du scutellum sont lisses et luisants, leurs côtés faiblement striés. Le reste du thorax mat et régulièrement strié. Couleur de l'ouvrière. Tête presque carrée, l'angle postérieur mousse et bref. Les deux faces épino-tales rectilignes forment un angle très obtus à sommet subdenté. Le nœud du pétiole n'est pas notablement plus haut que le postpétiole et plus épais sur le profil que chez *M. beduinus* Em., chez lequel il est plus haut. Ailes légèrement enfumées.

Maroc: Ras-el-Ma, ♀. — Amismiz, ♀. (Lindberg). — Haute Reraïa, ♀ (Alluaud).

*Messor arenarius* Rog.

Sbeitla.

*Messor barbarus* L.

Sta Helena. — Madrid, Aranjuez, Villalba. — Marseille.

*Messor barbarus* L. var. *niger* Sants.

*Messor barbarus* st. *capitatus* Latr. var.

Palermo, — Catane.

*Messor barbarus* L. *capitatus* Latr. var. *dentiscapus* For.

Sbeitla.

*Messor instabilis* Sm. st. *maroccanus* Em.

Tanger, — Amsitten.

*Goniomma hispanicum* André

Villalba, ♀ ♀ — Aranjuez ♂♀.