

Pheidole pallidula Nyl.

Palermo 2♂♂. — Sta Helena 2♂. — Vicalvaro 2♂♂. — Algeciras ♀.
Sierra de Cordoba ♀. Azrou ♀, ♀. Rabat ♀.

Monomorium (Xeromyrmex) salomonis L. var. *obscuriceps*. Sants.
Rabat.

Monomorium (Xeromyrmex) salomonis L. var. *transversale* Sants.
Marakech.

Monomorium (Xeromyrmex) subopacum Sm.

Reraïa ♀. — Tanger ♀, ♀.

Solenopsis fugax Latr.

Aranjuez, — Irun.

Crematogaster (Orthocrema) sordidula Nyl.

Tunisie: Zaghuan, Maroc: Tanger.

Crematogaster (Acrocoelia) scutellaris Ol.

Marseille. — Palermo, — Rometta.

Aranjuez, — Vicalvaro, — Sta. Helena, — Sierra de Cordoba.

Azrou.

Crematogaster (Acrocoelia) scutellaris Ol. var. *algifrica*. Luc.

Reraïa. ♀. Variété à tête plus lisse et plus luisante.

Crematogaster (Acrocoelia) auberti Em. var. *iberica* For.

Villalba, — Aranjuez.

Crematogaster (Acrocoelia) auberti Em. st. *fuentei* Menoz. var. *vivax*

Sants. Azrou, cette variété ressemble à *iberica*, mais elle est d'un noir plus pur avec les épines plus courtes.

Crematogaster (Acrocoelia) auberti Em. st. *theryi* Sants.

Azrou, — Kenitra.

Leptothorax fuentei Sants.

Vicalvaro.

Leptothorax boëticus Em.?

♀ (non décrite) Long: 5 mm. Couleur de l'ouvrière. Tête ridée. Mésonotum strié en long. Scutellum, pédoncule et gastre lisses. Tête un peu plus large que longue, bien plus courte que chez les races du *L. rottenbergi* Em., arrondie derrière les yeux, ceux-ci un peu plus grands que leur distance au bord antérieur de la tête. Le scape dépasse d'un sixième le bord postérieur de la tête. Thorax relativement plus court que chez *rottenbergi*. Epines épinotales horizontales, larges à la base, longues comme les deux tiers de l'intervalle de leur base. Nœud du pétiole en triangle à sommet obtusement tronqué sur le profil. Postpétiole environ un tiers plus large que le pétiole, presque aussi long que large et un peu plus large devant que derrière. Gastre court et échancré à la base.