

Seville. Une seule ♀ capturée sans les ouvrières, donc identité non certaine bien que provenant de la même localité que le type et sa parenté avec le groupe *rottenbergi*.

*Leptothorax anacanthus* Sants. st. *maximus* n. st.

♀. Long: 5 à 5, 8. Rouge ou rouge testacé, tête noire ou brun noirâtre, pattes et abdomen d'un brun plus ou moins foncé. Antennes, tarsi, et mandibules jaune roussâtre. Extrémité des derniers articles de l'antenne, tiers distal des scapes et bord des mandibules rembrunis. Mate. Des rides longitudinales assez régulières partent de l'aire frontale jusqu'au bord cervical, elles sont plus réticulaires sur les côtés de la tête. Thorax encore plus fortement ridé rugueux que la tête. Ces rides, longitudinales et serpigineuses sur la moitié antérieure du thorax, deviennent souvent transversales ou très réticulées dans l'autre moitié. Nœud du pétiole sculpté comme l'épinotum. Le fond de cette sculpture est moins nettement réticulé ponctué que sur la tête. Premier segment du gastre finement strié en long et mat. Les segments suivants, hanches et cuisses sont lisses et luisants. Tibias et scape finement réticulés ponctué et mats. Pilosité tronquée pâle, moyennement longue et abondante, manque sur les tibias qui sont brièvement pubescents.

Tête environ un quart plus longue que large, un peu rétrécie devant les côtés faiblement convexes. Le bord postérieur un peu convexe avec les angles brièvement arrondis. Yeux convexes, allongés, obliques au milieu des côtés, dont ils représentent un bon quart. Sillon frontal obsole. Aire frontale réticulée, mate. Epistome convexe, espacement ridé, sans réticulation ni ponctuation. Mandibules striées. Le scape atteint le bord postérieur de la tête. Articles 3 à 6 du funicule presque aussi épais que longs ou un peu plus longs qu'épais. Le deuxième aussi long que les deux suivants réunis, et le premier encore plus long. Thorax inerme, sans suture, assez convexe. La face déclive de l'épinotum subbordée latéralement. Nœud du pétiole arrondi, aussi large que long et presque aussi long que son pétiole antérieur; vu de côté il est plus long que haut. Postpétiole globuleux, aussi long que le pétiole, un peu plus large que long et aussi haut que large. Premier tergite du gastre aussi large que long, faiblement tronqué devant.

Cette race diffère du *L. anacanthus* Sants. par son gastre densément strié, mat, la taille plus grande et la massue moins obscure; c'est le plus grand *Leptothorax* connu.

Maroc: Djebel Amsitten. plusieurs ♀.