

bules larges, lisses avec deux dents apicales plus longues, les autres courtes. Antennes de 12 articles. Le scape atteint presque le bord postérieur de la tête. Premier article du funicule deux fois et demi plus long qu'épais. Les articles 2 à 7 environ aussi épais que longs. Pronotum un peu convexe devant, presque droit derrière avec le mésonotum. Face basale de l'épinotum oblique et droite sur le profil, un peu plus longue que les épines. Celles-ci longues comme la moitié de l'intervalle de leur base, droites et obliques en haut et en arrière sur le profil, divergentes dans les deux premiers tiers et nettement arquées en dedans dans le tiers distal. Face déclive bordée, concave de haut en bas, droite sur le plan transversal. Pétiole à sommet plus ou moins mousse, un quart plus long que haut et deux fois plus long que large. Postpétiole en ovale transversal un peu plus large que le pétiole et plus large que long. Gastre tronqué à la base.

Maroc. Grand Atlas. Amismiz. 24,26, V. 26. (Lindberg). 3 ♀.

Cette espèce est très voisine du *L. angustulus* Nyl. surtout de la race *trabuti* For. dont elle a la couleur et les épines, mais *lindbergi* a la sculpture plus fine, la tête et le thorax plus allongés, la partie inclinée sur le profil de la face basale de l'épinotum plus longue que les épines (plus courtes que celles-ci chez *trabuti*.) Le pétiole un peu plus long et plus mousse au sommet, bien moins denté dessous. Enfin la pilosité dressée moins abondante.

*Tetramorium caespitum* L. st. *hispanicum* Em. var. *ruginodis* Stitz ♀. (non décrite) Long: 6 mm. Noire. Appendices brun roussâtre, avec les mandibules, scapes, milieu des cuisses et tibias obscurcis. Dessus de la tête et thorax assez régulièrement striés, ridés en long presque sans réticulations dans les stries. mais avec quelques gros points. Face déclive de l'épinotum ridée striée en travers. Côtés de la tête plus irrégulièrement ridés réticulés. Fosses antennaires et lit du scape concentriquement ridés striés. Des rides serpigineuses sur le nœud du pétiole. Gastre lisse, plus ou moins strié à la base. Pilosité fine, roussâtre, plus courte sur le tête et le thorax, longue sur le pédoncule, rare ou nulle sur le dos du gastre.

Tête rectangulaire, un peu plus longue que large, faiblement rétrécie devant, les côtés et le bord postérieur subrectiligne, l'angle postérieur brièvement arrondi. Les yeux occupent en moyenne la cinquième partie des côtés. Epistome strié entre les arêtes frontales, presque lisse dans sa partie antérieure abrupte. Aire frontale et sillon frontal effacés. Mandibules luisantes, striées en long, armées de deux fortes dents apicales suivies de quatre plus petites. Le scape n'atteint pas tout à fait le bord