

postérieur de la tête. Thorax aussi large que la tête. La face basale de l'épinothum aussi peu oblique que chez *sublaeve* André. Epines épinothales fortes, larges à la base, longues comme le quart de leur intervalle. De petites dents aux angles inférieurs. Pédoncule à nœuds aussi transversaux que chez *T. ferox* Rusz. mais le bord supérieur du pétiole n'est pas échancré et son profil est très épais (tranchant chez *ferox*).

Voisine de *T. maurum* Sants. mais celle-ci a la tête plus courte, les sillons des rides réticulés, les rides longitudinales dans le lit du scape, cependant le pédoncule est à peine plus étroit. Les ♀ sont d'ailleurs bien distinctes.

Espagne: Villalba ♀. ♀. exemplaires noirâtres. — Sta Helena ♂ ♀. exemplaires brunâtres.

Tetramorium caespitum L. st. *biskrense* For.

Reraïa, Amismiz.

Tetramorium semilaeve André

Espagne 1930. (localité non indiquée).

Sousfamille **Dolichoderinae** For.

Tapinoma nigerrimum Nyl.

Rabat. ♂ — Villalba.

Tapinoma nigerrimum Nyl. var. *ibericum* Sants.

Amismiz.

Tapinoma simrothi Krausse

Casablanca. ♀ ♂. — Tanger. — Amismiz. — Ras-el-Ma. — Reraïa.
— Mogador.

Azrou. — Rabat.

Villalba. — Cordoba. — Sta Helena. ♂. — Marseille.

Sousfamille **Formicinae** Lepel.

Plagiolepis pygmaea Latr.

Marseille ♀

Plagiolepis barbara Sants.

Tanger. — Algeciras.

Plagiolepis crosi Sants.

Sta Helena, Sierra Morena.

Cette espèce, voisine de *barbara*, mais à antennes plus longues et couleur plus claire n'a été signalée que de Mascara (Algérie).

Lasius niger L.

Irun. — Aranjuez. — Paris. — Amismiz. — Reraïa. — Kenitra.