

*Camponotus (Myrmentoma) sicheli* Mayr. var. *rufa* Karav.

Azrou. — Reraïa. — Amismiz ♀, ♂.

*Camponotus (Colobopsis) truncatus* Spin.

Gibraltar.

*Formica (Formica) dusmeti* Em.

Algeciras.

Cette forme tient, par sa pilosité, sa place entre les *F. rufa* et *truncorum*. Les tibias sont plus pileux que chez *rufa* et moins que chez *truncorum*. Le scape reste glabre. La var. *frontalis* Sants. se rapporte à *F. dusmeti*, dont elle diffère par l'aire frontale brune et la pilosité plus développée des pattes.

*Formica (Serviformica) fusca*. L.

Irun.

*Formica (Serviformica) fusca* L. var. *maura* Sants.

Arround.

*Formica (Serviformica) fusca* L. st. *glebaria* For.

Aranjuez.

*Formica (Serviformica) subrufa* Rog.

Sierra de Cordoba.

*Proformica nasuta* Nyl. var. *ferreri* Bond.

Outre les caractères indiqués par Bondroit, *ferreri* a la tête plus rétrécie devant que *nasuta*. Elle est noire avec les appendices bruns, le funicule plus obscur.

*Cataglyphis (Monocombus) hispanica* For.

Sta Helena.

*Cataglyphis (Monocombus) viatica* F.

Cordoba.

*Cataglyphis (Cataglyphis) bicolor* F. st. *nodus* Brul. var. *oasium* Sants.

Tozzeur.

*Cataglyphis (Cataglyphis) bicolor* F. var. *pubens* Sants.

Marrakech, — Gharb, — Reraïa.

*Cataglyphis (Cataglyphis) albicans* Rog.

Azrou, — 2 ♀. Aranjuez 1 ♀. (Espèce de l'Afrique du Nord, Sa présence en Espagne me paraît douteuse.)

*Cataglyphis (Cataglyphis) albicans* Rog. st. *otini* Sants.

Vicalvaro 1 ♀. Race du Maroc. Même réserves que pour l'exemplaire ci-dessus. Je soupçonne une interposition d'étiquettes.