

étroit que la tête et un peu moins large que long, le bord antérieur arqué, les angles arrondis. Mésonotum un tiers plus large que long. Face basale de l'épinotum environ un tiers plus longue que la déclive, à profil horizontal à peine convexe et légèrement plus basse que le plan du promésonotum. Sillon métanotal médiocrement imprimé. La face déclive de l'épinotum devient brusquement plus abrupte à partir de son milieu où ses bords sont relevés d'une petite dent. Le nœud du pétiole a un profil rectangulaire, un tiers plus long que la hauteur de sa face postérieure plane, le dessus arrondi, aussi haut que l'épinotum ; vu de dessus il est environ un cinquième plus long que large derrière, près d'un quart plus étroit et arrondi devant, les côtés droits. Postpétiole environ un quart plus long que large, les côtés assez arqués, à peu près aussi grands que le segment suivant dont il est séparé par une assez forte stricture brunâtre.

Afrique australe : Grahamstown C. P. 1920 (T. HEWITT coll.), 2 ♂ dans la collection de M. G. ARNOLD.

Cette espèce se place près de *L. ferrarii* Forel dont elle diffère par la couleur, le corps plus étroit et les mandibules plus courtes.

**Bothroponera crassa** Em., st. **crassior** Sants. — Sud Rhodesia : Mtetengwe, 3 juin 1930 (G. ARNOLD).

Légère variété, l'avant-dernier article du funicule un peu plus court et l'angle de l'épinotum un peu plus arrondi, le reste comme chez *crassior*. 1 ♂.

**Aenictus rotundatus** Mayr, var. **merwei**, nov. — ♂. Diffère du type par la sculpture plus luisante de l'épinotum dont la face basale est plus ou moins sculptée, parfois entièrement lisse, tandis que chez le type elle est réticulée ponctuée. (Toutefois chez l'un des deux exemplaires types reçus autrefois de MAYR, le milieu de l'épinotum est lisse). L'échancrure métanotale est parfois un plus profonde devant l'épinotum. Pour le reste semblable au type.

Cape province : Montagu. Janvier 1920 (v. d. MERWE).

**Pheidole hewitti**, n. sp. — ♀. Long. 5,2 mm. D'un brun moyen rougeâtre avec les trois quarts postérieurs de la tête, le dessus du pronotum et du mésonotum noirâtres ou brun foncé. Devant de la tête et mandibules plus rougeâtres, articulations des pattes et tarses jaune brunâtre. Le tiers ou la moitié antérieure de la tête irrégulièrement strié en long. Ces stries sont plus longues sur le milieu du front et atteignent le vertex ; leur intervalle est lisse sur le front et densément réticulé-ponctué dans le lit du scape ; quelques rides faibles, espacées, interrompues et transversales sur le pronotum, le devant du mésotonum et les deux faces de l'épinotum ; espacées, irrégulières et plutôt longitudinales sur les côtés du mésonotum et du métasternum. Sauf le pronotum, le thorax est en outre densément et assez superficiellement ponctué réticulé et passablement luisant ainsi que le dessus des deux nœuds ; le reste