

est lisse et luisant. Pilosité dressée irrégulière espacée sur le corps. Partout une assez longue pubescence plus abondante sur le gastre et les appendices.

Tête un sixième plus longue que large au milieu et plus d'un tiers plus longue que large derrière, les côtés assez arqués, le bord postérieur bien échancré. Une impression triangulaire au vertex que continue le sillon frontal. Yeux au tiers antérieur des côtés. Arêtes frontales divergentes, prolongées par une ride au delà des fosses antennaires; celles-ci ne dépassent pas le milieu du scape. Épistome strié, faiblement caréné et un peu échancré au milieu de son bord antérieur. Le scape atteint les trois cinquièmes posté-




Fig. 2 à 5. — *Pheidole hewitti*, n. sp. Soldat : 2., tête; 3., thorax et pédoncule, de profil; 4., pédoncule vu de dessus. — Ouvrière : 5., tête.

rieurs de la tête (fig. 2). Troisième article du funicule aussi épais que long, les suivants un peu plus longs que larges. Dernier article de la massue plus court que l'ensemble des deux précédents. Mandibules lisses avec des points épars, bidentées. Pronotum arrondi, faiblement épaulé. Suture promésonotale distincte. Mésonotum à profil oblique, rectiligne, seulement interrompu par la légère saillie du bourrelet transversal. Face basale de l'épinothum trapézoïdale, aussi large derrière que longue, subbordée, un peu concave transversalement (fig. 3 et 4). Épines aiguës, obliques en dehors, longues comme la moitié de leur intervalle basal. Sommet du pétiole à peine échancré. Postpétiole à peine plus large que long, les côtés aigus.

♂. Long. 2,5 mm. (fig. 5). Noire; mandibules, articulations des pattes et tarsi jaunâtres; massues antennaires jaune brunâtre. Des stries arquées concentriquement dans et autour des fosses antennaires. Mésothorax, épinothum, métasternum, côtés du pétiole réticulés, ponctués, submats. Le reste lisse et luisant. Poils dressés assez abondants sur le corps, plus abondants sur le scape, plus obliques sur les pattes.