

Tête aussi large (avec les yeux) que longue; les côtés convexes, le bord postérieur transversal avec les angles très arrondis jusqu'aux yeux. Ceux-ci au milieu des côtés. Aire frontale distincte. Épistome arqué devant. Mandibules lisses faiblement striées sur les côtés, armées de deux dents apicales et de huit à dix denticules. Le scape, arqué à la base dépasse de près d'un tiers le bord postérieur de la tête. Articles 3 à 7 du funicule un peu plus longs que larges. Massues comme chez le ♂. Profil du promésotum en convexité allongée, à peine relevée par un petit tubercule latéral du mésotum. Faces de l'épinotum subégales formant un angle très obtus que souligne une petite dent aiguë. La face basale environ un quart plus longue que large derrière, assez plane et bordée. Sommet du pétiole entier, mousse sur le profil. Post-pétiole un quart plus long que haut et aussi large que long, arrondi dessus, un petit tubercule au milieu des côtés lui donne un aspect un peu anguleux.

Cape province : Cossakpost near Rasmead, 1920 (HEWITT) 1 ♂, 3 ♀.

Cette espèce est assez voisine de *Ph. xocensis* For. mais celle-ci a les côtés de la tête plus parallèles chez le ♂, et plus allongés chez la ♀.

Pheidole megacephala F., st. *rotundata* For. — ♀ V. (non décrite). Long. : 9 mm. Brune, les appendices jaune brunâtre, premier segment du gastre roussâtre sur les côtés. Tête plus large que longue et les côtés plus convergents que chez *megacephala*. Les arrêtes bien plus divergentes et écartées. Moitié postérieure du mésotum striée. Thorax et pédoncule plus larges. Ailes enfumées. Tout le reste comme chez *megacephala*. Les ouvrières qui accompagnent cette femelle sont plus sombres que le type *rotundata*. Le ♂ a les ocelles très grands aussi grands, que l'espace qui les sépare des yeux composés et se rapproche du ♂ de la race *ilgi* For. Chez *megacephala* et *pallidula* les ocelles sont aussi grands que la moitié de cet intervalle.

Sud Rhodesia ; Chiriada Forest (G. ARNOLD).

Monomorium altinode Sants., st. *tablensis*, nov. — ♀. Long. : 2 à 2,1 mm. D'un jaune d'ambre un peu brunâtre, tergites du gastre bordés de brun jaunâtre. Lisse sauf quelques rides sur le métasternum. Luisante. Pilosité dressée fine peu longue assez claire (fig. 6).

Tête rectangulaire, légèrement plus large que chez *altinode*, les côtés à peine arqués vers les angles, le bord postérieur droit. Yeux entre le quart antérieur et les milieux des côtés de la tête. Carène de l'épistome mousse, l'échancrure médiane du bord antérieur faible. Mandibules tridentées. Le scape atteint le bord postérieur de la tête. Premier article du funicule aussi long que l'ensemble des quatre suivants qui sont plus larges que longs. 1^{er} et 2^e article de la massue distinctement plus longs qu'épais, le terminal beaucoup plus épais et plus long que l'ensemble des deux précédents. Thorax plus étroit que la tête. Promésotum moyennement convexe. Les épaules un peu plus arrondies que chez *altinode*. Fond du sillon métanotal strié. Les faces épinoles peu distinctes sur le profil, la face basale étroite, la déclive triangulaire, subbordée. Pétiole plus longuement pédiculé devant que chez