

*altinode*, le nœud plus long vers la base mais aussi haut. Il est moins large et moins haut que chez *rhopalocerum* Em. Postpétiole arrondi, un peu incliné en avant et à peine plus large que le pétiole.

♀ V. Long : 4 à 4,2 mm. (fig. 7). D'un brun foncé; milieu des cuisses, gastre d'un brun rougeâtre avec le bord des segments jaune roussâtre comme le reste des appendices. Pilosité dressée de longueur très inégale. La tête est à peine plus longue que large, les côtés parallèles, le bord postérieur légèrement convexe. Les yeux sont un quart plus grands que leur intervalle au bord antérieur de la tête. Sillon frontal atteignant l'ocelle médian. L'intervalle entre l'ocelle médian et les latéraux, un peu plus grand que leur diamètre. Épistome abrupt, profondément sillonné entre les carènes. Mandi-




fig. 6 à 8. — *Monomorium altinode* Sants., st. *tablense*, n. st. : 6., Ouvrière, vue de profil; 7., Femelle. Épinothum et pédoncule, vis de profil; 8., *Monomorium captator* Sants., ouvrière.

bules coudées à leur base. Le scape n'atteint pas tout à fait le bord postérieur de la tête. Le mésonotum ne dépasse pas le pronotum. Les deux faces de l'épinothum forment un angle très obtus, mousse au sommet, subbordé, concave transversalement. Pétiole comme chez l'ouvrière. Postpétiole plus grand. Ailes légèrement enfumées à nervures brunes.

Cape Province : Table mount., 28 décembre 1913 (G. ARNOLD). ♂, ♀.

Chez *M. leimbachi* For. le pétiole est plus brièvement pédiculé devant et le nœud plus bas ressemble à celui de *rhopalocerum* Em. Chez *captator* Sants. le nœud est plus long à la base, la tête un peu plus longue.

*Cremastogaster (Acrocoelia) delagoensis* For., st. *merwei*, nov. — ♂. Long : 3,5 à 3,9 mm. Noire, parfois brun foncé, appendices brun noir. Joues, fosses antennaires et leur pourtour et lobes frontaux très finement striés ou striolés en long. Côtés du mésonotum, épinothum et métasternum réticulés ponctués avec quelques rides en plus sur la face basale de l'épinothum; le reste très finement chagriné et assez luisant, le front et le dessus du pronotum plus lisses et plus luisants. Quelques poils dressés vers la bouche