

et l'abdomen. Une pubescence courte blanchâtre, un peu espacée sur le corps et les appendices, plus relevée, et plus dense sur le scape.

Tête plus large que longue même chez les petites ouvrières. Les côtés et les angles postérieurs convexes; le bord postérieur droit. Les yeux un peu plus grands que chez *delagoensis*. Sillon frontal effacé (visible chez *delagoensis*). Aire frontale petite, nette. Mandibules striées. Le scape atteint ou dépasse de peu le bord postérieur de la tête. Sur le profil le promésotum fait une convexité plus régulière que chez le type de l'espèce; la face déclive du mésotum descend moins brusquement et continue la courbe de la face basale. Épinotum inerme, tuberculé, concave entre les tubercules. Disque du pétiole trapézoïdal, plus large que long, les angles antérieurs très arrondis. Sillon médian du postpétiole un peu plus accentué devant que chez *delagoensis* mais bien moins que chez *inermis*.

Cape Province : Montagu, janv. 1920 (v. d. MERWE leg.), 9 ♂.

Cremastogaster (Atopogyne) subsulcata, n. sp. — ♂. Long 4,3 à 4,7 mm. D'un jaune rouge testacé un peu brunâtre, le gastre brun noir à base jaune brunâtre. Joues, pourtour des fosses antennaires, épistome et côtés du thorax finement striés. Le reste lisse ou finement chagriné avec un éclat grassex ou luisant. Quelques rares poils dressés, plus longs sur le devant de la tête, plus courts et blanchâtres sur le gastre. Une très fine pubescence adjacente moyennement abondante sur le corps et les appendices.

Tête distinctement plus large que longue, un peu plus étroite devant, les côtés convexes, le bord postérieur droit, les angles très arrondis. Yeux légèrement en arrière du milieu des côtés. Sillon frontal effacé. Aire frontale nette, striolée ou luisante. Épistome convexe au milieu, échancré sur les côtés. Mandibules striées, de 4 dents. Le scape dépasse très légèrement le bord postérieur de la tête. Articles 3 à 7 du funicule plus larges que longs, les deux premiers articles de la massue aussi longs qu'épais au bout, et aussi longs ensemble que le dernier. Pronotum globuleux, non bordé, vu de dessus assez régulièrement arrondi. Suture promésotale distincte. Mésotum caréné devant où il est plus haut que le pronotum. Tiers postérieur du mésotum incliné en face déclive et que limite un léger bourrelet transversal à peine indiqué sur le profil. Face basale de l'épinotum convexe et longue, sur le profil, comme les deux cinquièmes de la face déclive. Vue de dessus, elle est plus large derrière que longue et assez concave entre les épines. Celles-ci, dentiformes, dirigées fortement en dehors et un peu en haut, longues comme le quart ou le cinquième de leur intervalle basal. La face déclive est bordée, faiblement oblique. Pétiole en trapèze aux angles antérieurs fortement arrondis presque deux fois plus large que long; armé dessous et en avant d'une petite dent dirigée en arrière. Postpétiole assez fortement échancré derrière sans impression ni sillon devant. Gastre assez grand.

Zoulouland : Hlabisa distr., octobre 1927 (MERLEY), 4 ♂.