

Cette curieuse espèce est assez embarrassante, son aspect général est celui du sous-genre *Sphaerocrema*, du groupe *sejuncta* et *welmani*, elle rappelle en outre les *Acrocoelia* du groupe *gerstaeckeri* par la forme du promésotum, mais l'échancrure, accentuée derrière et nulle devant, du postpétiole la fait placer dans le sous-genre *Atopogyne*. La découverte des sexués tranchera cette question.

Ocymyrmex velox, n. sp. — ♀. Long : 9 mm. Voisine de *O. picardi* For. dont elle diffère comme suit : Brun rougeâtre; tête plus claire à appendices plus obscurs, abdomen d'un brun jaunâtre ambré. Joues et front finement striés et longs; vertex striolé en travers. Cette sculpture devient lisse et luisante entre le milieu du front et les yeux ainsi que sur la face occipitale. Thorax plus faiblement strié ridé que chez *picardi*, en long sur le dessus et les côtés du pronotum et le métasternum, obliquement sur le mésosternum, en travers ou irrégulièrement ailleurs. Pédoncule très finement chagriné avec un éclat grasseyé et quelques stries derrière les nœuds. Gastre lisse et luisant. Pilosité dressée brunâtre, épaisse, assez abondante sur la tête et le thorax, plus courte mais épaisse et oblique sur les pattes et les scapes, dense sur les tibias. Premier segment du gastre presque glabre. Psammophores développés.

Tête rectangulaire, aussi longue que large devant, où elle est bien moins élargie que chez *picardi*. Le bord postérieur transversal, un peu échancré dans son tiers moyen. Sillon frontal faible ou quasi indistinct. Aire frontale striée. Épistome un peu convexe, atteignant le bord antérieur qui est moins arqué et moins échancré que chez *picardi*. Mandibules fortement striées de 6 dents, l'apicale très forte. Le scape dépasse d'un tiers le bord postérieur de la tête. Thorax un peu moins concave sur le profil que chez *picardi*, mais la face déclive de l'épinotum est moins abrupte. Nœuds du pétiole plus étroits et un peu plus bas. Postpétiole deux fois plus large que le pétiole, un peu plus long que large derrière, plus court que chez *picardi*. Premier segment du gastre également plus court.

Otjimbimbi : Kusnene, mars 1923 (G. ARNOLD), 3 ♀.

Cardiocondyla shuckardi For. — Cette espèce doit être séparée de *nuda* Mayr, elle est représentée dans l'Afrique australe par trois races et deux variétés, soit (fig. 9 à 12) :

- 1° *C. shuckardi* Forel 1891, Madagascar,
v. *sculptinodis* Santschi 1913, Madagascar.
- 2° st. *wasmanni* Sants. 1926, Cameroun,
v. *sculptior* Sants. 1926, Gabon.
- 3° st. *badoni* Arnold, Sud Rhodesia.

La race *badoni* diffère de *wasmanni* par la tête un peu plus petite, le pétiole plus bas, le postpétiole légèrement plus étroit, aussi long que large