

dessus de la tête, gastre, milieu des cuisses et des tibias d'un brun rouge foncé, passant au noir sur le milieu du gastre. Tête assez finement ridée en long. Ces rides sont un peu moins denses que chez *solidum* type, elles divergent un peu vers les angles postérieurs. Les interrises très finement ponctués réticulés, peu luisants. Ce fond de sculpture se retrouve sur le thorax, le pédoncule, le premier tergite du gastre et les appendices. Les rides, un peu plus fortes que sur la tête, sont longitudinales sur le dos du thorax, obliques sur ses côtés, irrégulièrement transversales sur les nœuds. Reste du gastre lisse et luisant. Pilosité dressée de moyenne longueur et assez abondante. (Un peu plus longue et plus rare chez *solidum*.)

Tête presque carrée, les côtés à peine arqués, le bord postérieur droit avec les angles brièvement arrondis. Yeux ovales, grands comme le quart des côtés de la tête dont ils occupent presque le milieu. Les crêtes frontales, assez espacées et échancrées, se continuent derrière par une ride limitant faiblement le lit du scape. Aire frontale étroite, ridée. Épistome ridé, la ride médiane se poursuit jusque sur le front, le bord antérieur échancré au milieu, mais moins profondément que chez *solidum*. Mandibules larges, fortement ridées, armées de 7 à 8 dents. Thorax comme chez *solidum*, la suture métanotale obsolète, parfois indiquée par un bout de ride transversale. Épines comme chez le type, plus longues qu'épaisses à la base. Profil du nœud du pétiole carré comme chez le type, plus long que son pédicule; vu de dessus il est bien plus rond et étroit devant que derrière et que chez le type. Postpétiole transversal. Du reste semblable.

Kimberley (POWER).

Cette race diffère à première vue du type par son abdomen sculpté et la couleur plus vive du thorax.

**Xiphomyrmex weitzaeckeri** Em., var. **nigellus**, nov. — ♀. Long. : 3,4 mm. Noire. Mandibules, dernier article de l'antenne, articulations des pattes et petits tarsi jaune brunâtre ou brun jaunâtre. Rides du thorax un peu ondulées. Épines épinoles plus longues que chez le type, longues comme deux fois l'intervalle de leur base. Corps un peu plus étroit, pour le reste semblable au type.

♀. Long. : 4,5 mm. Mésonotum et scutellum régulièrement ridé strié en long, assez peu réticulé dans les interrises. Tête carrée aussi large, avec les yeux, que le thorax. Les yeux sont un peu obliques et leur grand diamètre égale leur distance à l'angle antérieur de la tête. Épines horizontales, plus espacées et moins divergentes que chez l'♂, aussi longues que leur intervalle. Couleur de l'♂ mais les pattes plus brunes.

Sud Rhodesia; Vumbu mts, 5700 pieds. 2-15 février 1921 (G. ARNOLD).

**Rhoptromyrmex globulinodis** Mayr, var. **obscurus**, nov. — ♀. Long. : 3,4 mm. D'un brun assez foncé, parfois presque noir; le dessus de la tête et le milieu du gastre noirs. Mandibules, massues antennaires, articulations des