

pattes et tarses roux plus ou moins brunâtres. Un peu plus striée que chez le type surtout entre les arêtes frontales et les côtés de la tête, le reste comme chez le type.

♂. Comme chez le type mais plus foncé, les tarses jaune clair. A part un espace lisse et luisant entre les yeux et les ocelles, la tête est entièrement striée ponctuée et assez mate (chez le type le lit du scape est entièrement lisse ainsi qu'une grande partie du front).

Sud Rhodesia : Vumbu mts, Cloudland, 6000 pieds, avr. 1923 (G. ARNOLD).

Tapinoma (Micromyrma) modestum, n. sp. — ♀. Long. : 1,4 à 1,5 mm. Jaune ocré, gastre d'un jaune plus terne et parfois le vertex et le gastre légèrement rembrunis. Lisse. Pubescence très fine et très courte, ne voilant pas l'éclat. Seuls quelques poils dressées vers la bouche.

Tête rectangulaire, un peu plus longue que large, légèrement rétrécie devant, les côtés convexes, les angles postérieurs arrondis, le bord postérieur droit. Yeux convexes, environ d'un quart plus petits que leur intervalle au bord antérieur de la tête et placés entre le milieu et le tiers antérieur des côtés qu'ils n'atteignent pas vus de face. Arêtes frontales espacées (lf. 2,2). Aire frontale et sillon frontal indistincts. Épistome non caréné, légèrement échancré devant. Mandibules lisses avec trois petites dents antérieures suivies de denticules. Le scape atteint le bord postérieur de la tête. Articles 2 à 9 du funicule plus larges que longs, le deuxième plus court; le premier long comme l'ensemble des trois suivants. Thorax aussi long que la tête, le profil du dos presque droit. Angle de l'épinotum arrondi, la face basale plus large que longue, la face déclive bordée. Le pronotum est presque plus large que long et le mésonotum aussi large que long. L'écaille très basse.

Sud Rhodesia : Bulawayo, août 1917 (G. ARNOLD) ♀.

Camponotus (Orthonotomyrmex) liogaster, n. sp. — ♀. Long. : 4,8 à 5,8 mm. Noire. Appendices roux brunâtre avec le scape, le milieu des cuisses et des tibias d'un brun plus foncé. Trochanters, jaune roussâtre. Gastre luisant, le reste assez mat. Réticulé ponctué, la ponctuation disposée en séries comme les papilles digitales; cette sculpture est plus superficiellement réticulée en long que ponctuée et un peu plus luisante sur le front, longitudinale sur le pronotum avec, par places, une ponctuation dans le fond des sillons; elle prend un aspect irrégulièrement concentrique sur le devant du mésonotum, celui de la face basale de l'épinotum et le dessus de l'écaille, passant à la disposition transversale derrière. La face déclive de l'épinotum lisse. Gastre très finement chagriné en travers avec des espaces lisses. Pilosité dressée brunâtre, assez longue et pointue sur le thorax et le pétiole, un peu plus courte sur la tête et plus clairsemée sur le gastre. Pubescence oblique sur les antennes et les pattes, presque nulle sur le corps.

Tête trapézoïdale, environ un quart plus étroite devant que derrière et environ un cinquième plus longue que large; le bord occipital confondu