

avec le bord postérieur. Les côtés faiblement convexes, les angles postérieurs très arrondis. Yeux peu convexes, situés entre le tiers et le huitième postérieurs. Arêtes frontales aussi espacées derrière que longues et aussi longues que le sillon frontal, faiblement imprimé. Aire frontale petite, mate. Épistome caréné, sculpté comme la tête, avec le bord antérieur arqué et échancré latéralement. Mandibules avec des points épars armées de 5 dents. Le scape dépasse de deux fois son épaisseur le bord occipital. Disque du pronotum un tiers plus large que long, déprimé, bordé latéralement, avec les angles fortement arrondis. Mésonotum à profil horizontal, un peu convexe, un quart plus large devant que long. Sillon métanotal plus étroit mais aussi profond sur le profil que chez *sericeus*. La face basale convexe, oblique en arrière, environ un quart plus longue que large, les côtés subbordés et un peu arqués.

Face déclive verticale dans le haut, concave dans le bas, subbordée, faisant un angle léger, saillant et mousse, avec la face précédente. Nœud du pétiole un peu plus long que haut, le sommet déprimé aussi large au tiers antérieur que long, rétréci derrière. Gastre allongé.

Zoulouland : Hlabisa district, octobre 1927 (MERLEY).

Espèce un peu aberrante par son gastre luisant et allongé, pour le reste un vrai *Orthonotomyrmex*.

Camponotus (Myrmoturba) maculatus F., var. tuckeri, nov. — "♂. Long. 13 mm. Couleur disposée comme chez le type, sauf pour les taches de l'abdomen qui sont plus larges, confluentes en V sur le premier tergite du gastre, de façon que la pointe de leur intervalle aboutisse presque à l'articulation du pétiole et atteigne le bord postérieur de ce segment. Le deuxième tergite a une tache arrondie latérale ne dépassant pas le milieu de la longueur de ce segment. La tache du troisième segment est à peine indiquée ou obsolète. Le premier sternite du gastre, l'écaille, le milieu des cuisses jaune paille comme les taches du gastre. Tibias, métatarses, tête, scape, dos du thorax et reste du gastre noirs. Funicule, petits tarsi, bords du pronotum, mésosternum, métasternum et genoux roussâtres. Quelques poils sous la tête, clairsemés sur le corps. Les aiguillons des tarsi plus fins mais plus nombreux que chez le type. Tête et thorax plus mats, du reste semblable.

♀. Long. : 10 mm. Jaune roussâtre, dos du thorax légèrement rembruni; tête, tibias et tarsi d'un brun roussâtre plus ou moins foncé. Gastre comme chez la "♂, mais les taches latérales du deuxième tergite atteignent le bord postérieur du segment. Forme de la tête comme chez *aegyptiacus* Em. ou légèrement plus allongée.

♂ Long : 9,8 mm. Roussâtre; gastre noir; mandibules, front, vertex, scapes, bandes parapsidiales, bord du scutellum, bord supérieur des fémurs, tibias et métatarses d'un brun roussâtre. Ailes un peu jaunâtres avec les nervures roussâtres. Densément et finement ponctué, mat. Gastre finement chagriné en travers et assez luisant.