

Tapinoma erraticum Latr.

Sierra de Guadarrama.—Malagón.

Tapinoma Simrothi Kraus.

Vaciamadrid.—Benasque.—Huelva.

Dolichoderus (Hypoclinea) quadripunctata L.

Viladrau (G.).

Sousfamille des FORMICINÆ

Camponotus (Camponotus) vagus Scop.

Viladrau (G.).

Camponotus (Myrmoturba) ethiops Latr.

Sevilla.—Sierra de Guadarrama.

Camponotus (Myrmoturba) Foreli Em.

Vaciamadrid.—♂, ♀.—Tiermas.—Aranjuez.—Archena.—Fortuna.—Belinchón.

Camponotus (Myrmoturba) silvaticus Ol. v. *catalanus* Em.

Fortuna.—Archena.

Camponotus (Myrmoturba) silvaticus st. *pilicornis* Rog.

Villaharta (Córdoba).

Camponotus (Myrmosericus) micans Nyl.

Vaciamadrid.—Huelva.—Pozuelo ♂.—Fortuna.

Camponotus (Myrmosericus) cruentatus Latr. Arenas S. Pedro (pr. Ávila).—Tabescono.—Villaharta (Córdoba).—Mósteles.—Viladrau (G.), 6, VIII, 26 ♀.

Camponotus (Myrmentoma) piceus Leach. *spissinodis* For. v. *Dusmeti* n. var. ♂. Epinotum concave comme chez la var. *figaro* Em., mais le corps est entièrement noir, les pattes en parties brun rougeâtre. (Au moins le pronotum rougeâtre chez *figaro*). On trouve des passages entre ces deux formes. Ressemble aussi beaucoup à *piceus* type, mais celui-ci a l'écaille nettement plus amincie vers le sommet.

Vilafrá 3 ♂ (types).—Archena.—Ríofrío (Guadalaja-