

ra.—Montarco.—Villalba (Madrid).—France: Pyrénées Orientales, Mont Canigou (A. Weiss).—Var, Mont Fenouillet (Parker).

Camponotus (Myrmentoma) lateralis Ol. v. *balearis* Sants.

Sierra Nevada. 1 ♂. Cette variété fait passage à la var. *Armouri* Wheel des Baléares et que j'ai reçue du Maroc et de Marseille.

Lasius (Lasius) niger L.

Tarragona.—Sahún.—Covadonga ♂, ♀.

Lasius (Lasius) niger v. *grandis* For.

Sierra Nevada.—Sierra de Guadarrama.—Bilbao. Benasque.—Covadonga.—Albacete.

Lasius (Lasius) brunneus Latr.

Pozuelo de Calatrava.

Lasius (Lasius) emarginatus Latr.

Montserrat.—Viladrau.—S. J. Abadesas.

Lasius (Formicina) flavus F.

Covadonga.

Lasius (Dendrolasius) fuliginosus Latr.

Covadonga.

Polyergus rufescens Latr.

Gijón.

Formica (Formica) rufa L.

Sierra de Guadarrama.

Formica (Formica) rufa st. *pratensis* Retz. v. *nigricans* Em.).

Benasque.—Escaray (Logroño). Sahún (H.^a). VII, 1930, 1 ♀.

Formica (Formica) rufa st. *Dusmeti* Em.

Cotos.

Formica (Raptiformica) sanguinea Latr. v. *flavorubra* For.

Covadonga.—Leitariegos.—Exemplaires un peu plus foncés que la var. *flavorubra*, mais sans les taches brunes de la forme type.